

## Vogelarten am Alfsee

> Beobachtungspunkt im Nordosten / Schutzhütte im Frühling

Sommervogel

Brutvogel

Wintervogel

Durchzügler



### Höckerschwän (Cygnus olor)

> orangeroter Schnabel mit schwarzem Höcker und schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß; Größe: bis 160 cm  
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



### Graugäns (Anser anser)

> Kräftiger, orangener Schnabel; braungraues Gefieder; Beine blaß rosa; größte graue Gäns; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 84 cm  
> In allen Becken zu sehen



### Kanadagäns (Branta canadensis)

> Kopf und Hals schwarz mit charakteristischem weißen Kinnband; Auge im schwarzen Stirnfeld; Rücken graubraun; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 100 cm  
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



### Brandgäns (Tadorna tadorna)

> markante grünschwartz-weiß-braune Gefiederfärbung; roter Schnabel; Männchen mit Höcker am Schnabelansatz; in der Größe zwischen Gans und Ente; Größe: bis 65 cm  
> im Hauptbecken und im Reservebecken auf den Schlammflächen zu sehen



### Stockente (Anas platyrhynchos)

> Schwimmte; graubraunes Gefieder; Männchen mit grünblau schimmerndem Kopf; Beine orange; Federspitzen bei Männchen gekringelt; Weibchen braun; bei beiden auf dem Flügel blaues weiß eingerahmtes Feld; Größe: bis 60 cm  
> in allen Becken zu sehen



### Reiherente (Aythya fuligula)

> Tauchente; gelbe Iris; Männchen schwarz-weiß mit schwarzem Federschopf am Hinterkopf; Weibchen dunkelbraun z.T. mit weißem Gefieder um den Schnabel; Größe: bis 47 cm  
> In allen Becken zu sehen



### Schnatterente (Anas strepera)

> orangegelbe Beine; weißes Feld auf dem Flügel; Männchen ist im Prachtkleid dunkelgrau mit schwarzem Körperende sonst braun wie das Weibchen; Größe: bis 56 cm  
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



### Tafelente (Aythya ferina)

> Tauchente; im Schwimmen unter Wasser liegender Schwanz; Männchen mit rostrottem Kopf und Hals; hellgrauem Rückengefieder; rote Iris; Weibchen grau bis graubraun; Iris braun; Größe: bis 49 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



### Krickente (Anas crecca)

> Kleine Schwimmte; Männchen haben einen kastanienbraunen Kopf mit grün glänzendem Band am Auge; gelbes Feld an den Hinterflanken; zur Brutzeit ruffreudig; Weibchen braun mit grünem Feld auf dem Flügel; Größe: bis 38 cm  
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



### Löffelente (Anas clypeata)

> Gründelente; kennzeichnend ist der breite löffelförmige Schnabel; Männchen mit buntem weiß-schwarz-braunem Gefieder; gelbe Iris; Weibchen braun; Bei Nahrungssuche flache Körperhaltung; Größe: bis 52 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



### Pfeifente (Anas penelope)

> Kurzer hellgrauer Schnabel; Männchen haben einen rotbraunen Kopf mit gelber Stirn; Körper grau-weiß-schwarz; Brust graurosa; Männchen sehr ruffreudig; Weibchen und Männchen im Schlichtkleid rostrot; Größe: bis 50 cm  
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



### Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

> kleinster Taucher; fast einfarbig ruficollis; zur Brutzeit Kehle und Hals rostrot mit markantem gelben Fleck am Schnabelgrund; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 29 cm  
> vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen



### Haubentaucher (Podiceps cristatus)

> Größter Taucher; Unverwechselbar Federhaube am Kopf; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Herbstkleid Kopfseiten und Nacken braun; im Herbstkleid weißes Federkleid Größe: bis 51 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



### Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)

> Kleiner Taucher; gelbe Schmuckfedern hinter der roten Iris; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Federkleid schwarz-rotbraun; im Herbstkleid weißes Federkleid; Größe: bis 34 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



### Rothalstaucher (Podiceps grisegena)

> Taucher; gelbe Schnabelbasis; zur Paarungszeit Kopfseiten und Kehle weiß mit rotem Hals und schwarzem Oberkopf; Gefieder graubraun; Größe: bis 46 cm  
> seltener Gast im Hauptbecken



### Blässhuhn (Fulica atra)

> Rallenart; schwarzes Gefieder; Schnabel und Stirn weiß; kräftige Füße; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm  
> in allen Becken zu sehen



### Kormoran (Phalacrocorax carbo)

> Gefieder überwiegend schwarz; kräftiger Hakenschnabel; grüne Iris; liegt sehr tief im Wasser; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 94 cm  
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



### Graureiher (Ardea cinerea)

> Grau-weiße Färbung mit schwarzen Oberkopfseiten mit zwei langen schwarzen Nackenfedern; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 102 cm  
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



### Silberreiher (Casmerodius albus)

> Schlanker weißer Reiher mit gelbem Schnabel; Beine grünlich oder schwarz; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 100 cm  
> im Reservebecken und an den Ufern des Hauptbeckens zu sehen



### Turmfalke (Falco tinnunculus)

> Oberseite rotbraun mit dunkleren Schwungfedern; abgerundeter Kopf; graublauer Bartstreif; rüttelt häufig mit langen gefächerten Schwanz; Größe: bis zu 37 cm  
> häufiger Nahrungsgast am Haupt- und Reservebecken



### Mäusebussard (Buteo buteo)

> sehr unterschiedliche Färbungen von überwiegend weiß bis dunkelbraun; Schnabel schwarz; Männchen mit gelber Wachshaut; Füße gelb; im Flug mit bretartig gerader Flügelstellung; Größe: bis 58 cm  
> häufiger Nahrungsgast im Reservebecken



### Rohrweihe (Circus aeruginosus)

> Männchen mit hellgrau-brauner Flügelzeichnung; Weibchen dunkelbraun mit cremefarbener Kopfhaut; beide im Flug mit V-förmiger Flügelstellung; Größe: bis 55 cm  
> gelegentlicher Nahrungsgast im Reservebecken oder den Röhrlichzonen des Haupt- und Absetzbecken



### Fischadler (Pandion haliaetus)

> Kopf weiß mit markantem braunem Augestreif; Iris gelb; Oberseite dunkelbraun; Unterseite weiß; Federschopf am Hinterkopf; Größe: bis 60 cm  
> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



### Seeadler (Haliaeetus albicilla)

> großer kräftiger Greifvogel; weißer, kurzer, keilförmiger Schwanz; starke, gelbe Greiffüße; Gefieder braun; breittartige Flügel; Altvögel mit gelbem Schnabel; Weibchen größer als Männchen; Größe: bis 92 cm  
> seltener Nahrungsgast, meist Jungtiere



### Rotmilan (Milvus milvus)

> stark gegabelter rostroter Schwanz; braunrotes Gefieder; Kopf grauweiß; ruhiger, gleitender Flug; Weibchen und Männchen ähnlich; Größe: bis 72 cm  
> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



### Schwarzmilan (Milvus migrans)

> vorwiegend dunkelbraun gefärbt; Brust und Bauch häufig etwas heller; Kopf und Hals im Adultkleid hellgrau; Schwanz leicht gegabelt; Größe: bis 58 cm  
> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



### Lachmöwe (Larus ridibundus)

> Schwarzer Kopf; Schnabel und Beine rot; weiß-graue Gefiederzeichnung; Männchen und Weibchen gleich; Größe: bis 39 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



### Silbermöwe (Larus argentatus)

> gelber klobiger Schnabel mit rotem Fleck; rosa Beine; Gefieder weiß-silbergrau; Iris gelb; größer als Sturm Möwe; im ersten und zweiten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 60 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



### Sturmmöwe (Larus canus)

> Schnabel und Beine gelb; Gefieder weiß mit silbergrauen Flügeln; Flügelspitze schwarz; größer als Lachmöwe; kleiner als Silbermöwe; im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 46 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



### Heringsmöwe (Larus fuscus)

> gelber Schnabel mit rotem Fleck; Iris und Beine gelb; Gefieder weiß mit dunkelgrauer Oberseite; Jungvögel im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 56 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



### Zwergmöwe (Hydrocoloeus minutus)

> Kleinste Möwe; schwarzer Kopf und Schnabel; Beine rot; Gefieder grau-weiß; im Schlichtkleid schwarzer Ohrfleck; Größe: bis 28 cm  
> vorrangig in der 2. Aprilhälfte im Hauptbecken zu sehen



### Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)

> schwarz-graues Gefieder; Schnabel und Beine dunkel; lange, schlanke Flügel; wellenförmig, schwebendes Flugbild; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen während des Heimzuges im Frühjahr



### Fluss-Seeschwalbe (Sterna hirundo)

> Oberseite grau mit schwarzer Haube; Unterseite hellgrau; roter Schnabel mit schwarzer Schnabelspitze; Beine rot; Schwanz tief gegabelt; Größe: bis zu 37 cm  
> Seltener Gast am Hauptbecken



### Flussuferläufer (Actitis hypoleucos)

> Watvogel; braunes Rückengefieder und weiße Unterseite; weißer Keil zwischen Flügel und Brust; wippt oft mit dem Körperende; im Flug mit weißem Streifen im Flügel; Größe: 20 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



### Grünschenkel (Tringa nebularia)

> Watvogel; grüngraue lange Beine; langer, leicht nach oben gebogener Schnabel in grüngrün mit dunkler Spitze; braun-grau-weiß gemustertes Gefieder; Flügeloberseite einfarbig ohne Zeichnung; Größe: bis 34 cm  
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



### Austernfischer (Haematopus ostralegus)

> Watvogel; langer orangeroter Schnabel; stark abgesetzte schwarzweiße Gefiederfärbung; rote Beine; Männchen und Weibchen sind nicht zu unterscheiden; Größe: bis 44 cm  
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



### Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

> Kleinvogel des Röhrichts; Männchen mit schwarzem Kopf; Weibchen braun gestreift; Brutet im Röhricht am West- und Südostufer des Hauptbeckens und im Reservebecken; Gesang schilpend; Größe: bis 15,5 cm



### Rauchschnalbe (Hirundo rustica)

> braunrote Kehle und Stirn sowie tief gegabelter Schwanz; Oberseite und Brustband blauschwarz; Unterseite rahmweiß; Größe: 21 cm  
> Hauptsächlich im Frühjahrszug, sitzen dann oft im Schilf oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken



### Mehlschnalbe (Delichon urbicum)

> schwach gegabelter Schwanz und weißer Bürzel; Kopf, Rücken, Flügeloberseiten und Schwanz blauschwarz; Unterseite mehlschwarz; Größe: 15 cm  
> Hauptsächlich im Frühjahrszug, sitzen dann oft im Schilf oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken



### Uferschnalbe (Riparia riparia)

> Kleine europäische Schnalbenart; Oberseite matt graubraun; Unterseite weiß mit graubraunem Brustband; Schwanz leicht gegabelt; Größe: bis 13 cm  
> Hauptsächlich im Frühjahrszug, sitzen dann oft im Schilf oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken



### Mauersegler (Apus apus)

> Großer Segler; lange sichelförmige Flügel; kurzer gegabelter Schwanz; Gefieder schwarzbraun; weißer Kehlfleck; kurzer schwarzer Schnabel; Größe: bis zu 19 cm  
> Nahrungsgast zu Mückenhochzeiten. Fliegt oft dicht an Spaziergängern vorbei