

Vogelarten am Alfsee

> Beobachtungspunkt im Nordosten / Schutzhütte im Sommer

● Sommervogel

B Brutvogel

○ Wintervogel

> Durchzügler



● ○ > B

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

> orangeroter Schnabel mit schwarzem Höcker und schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß; Größe: bis 160 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



● ○ > B

Graugans (*Anser anser*)

> Kräftiger, oranger Schnabel; braungraues Gefieder; Beine blaß rosa; größte graue Gans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 84 cm
> In allen Becken zu sehen



● ○ >

Kanadagans (*Branta canadensis*)

> Kopf und Hals schwarz mit charakteristischem weißen Kinnband; Auge im schwarzen Stirnfeld; Rücken graubraun; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 100 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



> >

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

> markante grünschwarz-weiß-braune Gefiederfärbung; roter Schnabel; Männchen mit Höcker am Schnabelansatz; in der Größe zwischen Gans und Ente; Größe: bis 65 cm
> im Hauptbecken und im Reservebecken auf den Schlammflächen zu sehen



● ○ > B

Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)

> auffällige Gans mit braunem Augenfleck; lange rosa Beine; Oberseite grau- bis rotbraun; Unterseite grau; Kopf hellgrau; Größe: bis 73 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ > B

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

> Schwimmte; graubraunes Gefieder; Männchen mit grünblau schimmerndem Kopf; Beine orange; Federspitzen bei Männchen gekringelt; Weibchen braun; bei beiden auf dem Flügel blaues weiß eingerahmtes Feld; Größe: bis 60 cm
> in allen Becken zu sehen



● ○ > B

Reihente (*Aythya fuligula*)

> Tauchente; gelbe Iris; Männchen schwarz-weiß mit schwarzem Federschopf am Hinterkopf; Weibchen dunkelbraun z.T. mit weißem Gefiederring um den Schnabel; Größe: bis 47 cm
> In allen Becken zu sehen



● ○ >

Schnatterente (*Anas strepera*)

> orangegelbe Beine; weißes Feld auf dem Flügel; Männchen ist im Prachtkleid dunkelgrau mit schwarzem Körperende sonst braun wie das Weibchen; Größe: bis 56 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



● ○ >

Tafelente (*Aythya ferina*)

> Tauchente; im Schwimmen unter Wasser liegender Schwanz; Männchen mit rostrottem Kopf und Hals; hellgrauem Rückengefieder; rote Iris; Weibchen grau bis graubraun; Iris braun; Größe: bis 49 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ >

Löffelente (*Anas clypeata*)

> Gründelente; kennzeichnend ist der breite löffelförmige Schnabel; Männchen mit buntem weiß-schwarz-braunem Gefieder; gelbe Iris; Weibchen braun; Bei Nahrungssuche flache Körperhaltung; Größe: bis 52 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ >

Pfeifente (*Anas penelope*)

> Kurzer hellgrauer Schnabel; Männchen haben einen rotbraunen Kopf mit gelber Stirn; Körper grau-weiß-schwarz; Brust graurosa; Männchen sehr ruffreudig; Weibchen und Männchen im Schlichtkleid rostrot; Größe: bis 50 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



● ○ >

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

> kleinster Taucher; fast einfarbig braun; zur Brutzeit Kehle und Hals rostrot mit markantem gelben Fleck am Schnabelgrund; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 29 cm
> vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen



● ○ > B

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

> Größter Taucher; Unverwechselbare Federhaube am Kopf; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid Kopfseiten und Nacken braun; im Herbst grau-weißes Federkleid Größe: bis 51 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ > B

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

> Kleiner Taucher; gelbe Schmuckfedern hinter der roten Iris; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid schwarz-rotbraun; im Herbst grau-weißes Federkleid; Größe: bis 34 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ > B

Blässhuhn (*Fulica atra*)

> Rallenart; schwarzes Gefieder; Schnabel und Stirn weiß; kräftige Füße; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm
> in allen Becken zu sehen



● ○ > B

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

> Gefieder überwiegend schwarz; kräftiger Hakenschnabel; grüne Iris; liegt sehr tief im Wasser; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 94 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ >

Graureiher (*Ardea cinerea*)

> Graureiher mit schwarzem Oberkopfseiten mit zwei langen schwarzen Nackenfedern; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 102 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ >

Silberreiher (*Casmerodius albus*)

> Schlanker weißer Reiher mit gelbem Schnabel; Beine grünlich oder schwarz; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 100 cm
> im Reservebecken und an den Ufern des Hauptbeckens zu sehen



● ○ >

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

> Oberseite rotbraun mit dunkleren Schwungfedern; abgerundeter langer Schwanz; Beinrest gelb mit dunklerem Schwanz; Größe: bis zu 37 cm
> häufiger Nahrungsgast an Haupt- und Reservebecken



● ○ > B

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

> sehr unterschiedliche Färbungen von überwiegend weiß bis gänzlich dunkelbraun; Schnabel schwarz mit gelber Wachshaut; Füße gelb; im Flug mit brettförmiger Flügelstellung; Größe: bis 58 cm
> häufiger Nahrungsgast im Reservebecken



● >

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

> Männchen mit hellgrau-bräunlicher Zeichnung; Weibchen dunkelbraun mit cremefarbener Kopfhaube; beide im Flug mit V-förmiger Flügelstellung; Größe: bis 55 cm
> gelegentlicher Nahrungsgast im Reservebecken oder den Röhrichtzonen des Haupt- und Absetzbeckens



● >

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

> Kopf weiß mit markantem braunem Augestreif; Iris gelb; Oberseite dunkelbraun; Unterseite weiß; Federschopf am Hinterkopf; Größe: bis 60 cm
> seltener Nahrungsgast am Hauptbeck



● >

Rotmilan (*Milvus milvus*)

> stark gegabelter rostroter Schwanz; braunrotes Gefieder; Kopf grauweiß; ruhiger, gleitender Flug; Weibchen und Männchen ähnlich; Größe: bis 72 cm
> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



● >

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

> vorwiegend dunkelbraun gefärbt; Brust und Bauch häufig etwas heller; Kopf und Hals im Adultkleid hellgrau; Schwanz leicht gegabelt; Größe: bis 58 cm
> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



● ○ >

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

> Schwarzer Kopf; Schnabel und Beine rot; weiß-graue Gefiederzeichnung; Männchen und Weibchen gleich; Größe: bis 39 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ >

Silbermöwe (*Larus argentatus*)

> gelber klobiger Schnabel mit rotem Fleck; rosa Beine; Gefieder weiß-silbergrau; Iris gelb; größer als Sturm- und Lachmöwe; im ersten und zweiten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 60 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ >

Sturmmöwe (*Larus canus*)

> Schnabel und Beine gelb; Gefieder weiß mit silbergrauen Flügeln; Flügelspitze schwarz; größer als Lachmöwe; kleiner als Silbermöwe; im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 46 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



○ >

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

> gelber Schnabel mit rotem Fleck; Iris und Beine gelb; Gefieder weiß mit dunkelgrauer Oberseite; Jungvögel im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 56 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● >

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

> großer Schreitvogel; Gefieder weiß-schwarz; Schnabel und Beine leuchtend rot; Männchen etwas größer als Weibchen; Größe: bis 100 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● >

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

> Watvogel; braunes Rückengefieder und weiße Unterseite; weißer Keil zwischen Flügel und Brust; wippt oft mit dem Körperende; im Flug mit weißem Streifen im Flügel; Größe: 20 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



>

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

> Watvogel; grüngraue lange Beine; langer, leicht nach oben gebogener Schnabel in grüngrau mit dunkler Spitze; braun-grau-weiß gemustertes Gefieder; Flügeloberseite einfarbig ohne Zeichnung; Größe: bis 34 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



>

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

> Watvogel; langer orangeroter Schnabel; stark abgesetzte schwarzbraune Gefiederfärbung; rote Beine; Männchen und Weibchen sind nicht zu unterscheiden; Größe: bis 44 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



> B

Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*)

> Kleinvogel des Röhrichts; Männchen mit schwarzem Kopf; Weibchen braun gestreift; Brütet im Röhricht am West- und Südufer des Hauptbeckens und im Reservebecken; Gesang schilpend; Größe: bis 15,5 cm



● >

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

> braunrote Kehle und Stirn über tief gegabelter Schwanz; Oberseite und Brustband blauschwarz; Unterseite rahmweiß; Größe: 21 cm
> Hauptsächlich im Frühjahrzug, sitzen dann oft im Schilf oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken