

# Vogelarten am Alfsee

## > Beobachtungspunkt NuBA im Winter

● Sommervogel

B Brutvogel

○ Wintervogel

➤ Durchzügler



● ○ ➤ B  
**Höckerschwan (*Cygnus olor*)**  
> orangeroter Schnabel mit schwarzem Höcker und schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß; Größe: bis 160 cm  
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



○ ➤  
**Blässgans (*Anser albifrons*)**  
> Blässe über dem kleinen, orangefarbenen Schnabel; Beine orange; erwachsene Vögel mit schwarzen Streifen am Bauch; kleiner als Graugans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 78 cm  
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ ➤ B  
**Graugans (*Anser anser*)**  
> Kräftiger, oranger Schnabel; braungraues Gefieder; Beine blaß rosa; größte graue Gans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 84 cm  
> In allen Becken zu sehen



○ ➤  
**Saatgans (*Anser fabalis*)**  
> schwarz-orangefarbener Schnabel; Hals und Kopf dunkler gefärbt; Beine orange; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 88 cm  
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ ➤  
**Kanadagans (*Branta canadensis*)**  
> Kopf und Hals schwarz mit charakteristischem weißen Kinnband; Auge im schwarzen Stirnfeld; Rücken graubraun; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 100 cm  
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



● ○ ➤ B  
**Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)**  
> auffällige Gans mit braunem Augenfleck; lange rosa Beine; Oberseite grau- bis rotbraun; Unterseite grau; Kopf hellgrau; Größe: bis 73 cm  
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ ➤ B  
**Stockente (*Anas platyrhynchos*)**  
> Schwimmente; graubraunes Gefieder; Männchen mit grünblau schimmerndem Kopf; Beine orange; Federspitzen bei Männchen gekringelt; Weibchen dunkelbraun; bei beiden auf dem Flügel blaues weiß eingerahmtes Feld; Größe: bis 60 cm  
> in allen Becken zu sehen



● ○ ➤ B  
**Reiherente (*Aythya fuligula*)**  
> Tauchente; gelbe Iris; Männchen schwarz-weiß mit schwarzem Federschopf am Hinterkopf; Weibchen dunkelbraun z.T. mit weißem Gefiederring um den Schnabel; Größe: bis 47 cm  
> In allen Becken zu sehen



● ○ ➤  
**Schnatterente (*Anas strepera*)**  
> orangegelbe Beine; weißes Feld auf dem Flügel; Männchen ist im Prachtkleid dunkelgrau mit schwarzem Körperende sonst braun wie das Weibchen; Größe: bis 56 cm  
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



● ○ ➤  
**Tafelente (*Aythya ferina*)**  
> Tauchente; im Schwimmen unter Wasser liegender Schwanz; Männchen mit rostrottem Kopf und Hals; hellgrauem Rückengefieder; rote Iris; Weibchen grau bis graubraun; Iris braun; Größe: bis 49 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



○ ➤  
**Krickente (*Anas crecca*)**  
> Kleine Schwimmente; Männchen haben einen kastanienbraunen Kopf mit grün glänzendem Band am Auge; gelbes Feld an den Hinterflanken; zur Brutzeit ruffedrig; Weibchen braun mit grünem Feld auf dem Flügel; Größe: bis 38 cm  
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



○ ➤  
**Löffelente (*Anas clypeata*)**  
> Gründelente; kennzeichnend ist der breite löffelähnliche Schnabel; Männchen mit buntem weiß-schwarz-braunem Gefieder; gelbe Iris; Weibchen braun; Bei Nahrungssuche flache Körperhaltung; Größe: bis 52 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



○ ➤  
**Pfeifente (*Anas penelope*)**  
> Kurzer hellgrauer Schnabel; Männchen haben einen rotbraunen Kopf mit gelber Stirn; Körper grau-weiß-schwarz; Brust graurosa; Männchen sehr ruffedrig; Weibchen und Männchen im Schlichtkleid rostrot; Größe: bis 50 cm  
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



○ ➤  
**Spießente (*Anas acuta*)**  
> Gründelente; Männchen mit braun-weißer Halszeichnung und langem Schwanzspieß; Weibchen braun mit weniger stark ausgeprägtem Spieß; Größe: bis 62 cm  
> Seltener Gast im Haupt- oder Reservebecken



○ ➤  
**Schellente (*Bucephala clangula*)**  
> Tauchente; gedrungener Körper; dreieckiger Kopf; Männchen schwarz-weiß mit weißem Fleck oberhalb des Schnabels; gelbe Iris; Weibchen unscheinbarer graubraun; Größe: bis 48 cm  
> vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen



○ ➤  
**Zwergsäger (*Mergellus albellus*)**  
> Kleiner Säger; Männchen weiß mit feinen schwarzen Linien; Weibchen am Kopf und Nacken rotbraun; Kehle weiß; Rücken grau; Größe: bis 44 cm  
> im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen und im Reservebecken



○ ➤  
**Gänsesäger (*Mergus merganser*)**  
> Großer Säger; langer, roter Hakenschnabel; Männchen weiß mit grünblau schimmerndem Kopf und Hals; Rücken schwarz; Weibchen am Kopf und Hals rotbraun; Körper hellgrau; markanter Schopf am Hinterkopf; Größe: 68 cm  
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



○ ➤  
**Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)**  
> kleinster Taucher; fast einfarbig braun; zur Brutzeit schwarz rotrot mit markantem gelben Fleck am Schnabelgrund; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 29 cm  
> vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen



● ○ B  
**Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)**  
> Größter Taucher; Unverwechselbare Federhaube am Kopf; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid Kopfseiten und Nacken braun; im Herbst grau-weißes Federkleid Größe: bis 51 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



○ ➤ B  
**Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)**  
> Kleiner Taucher; gelbe Schmuckfedern hinter der roten Iris; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid schwarz-rotbraun; im Herbst grau-weißes Federkleid; Größe: bis 34 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



○ ➤  
**Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)**  
> Taucher; gelbe Schnabelbasis; zur Paarungszeit Kopfseiten und weiß mit rottem Fleck mit schwarzem und schwarzem Oberkopf; Gefieder graubraun; Größe: bis 46 cm  
> seltener Gast im Hauptbecken



● ○ ➤ B  
**Blässhuhn (*Fulica atra*)**  
> Rallenart; schwarzes Gefieder; Schnabel und Stirn weiß; kräftige Füße; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm  
> in allen Becken zu sehen



● ○ B  
**Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)**  
> Gefieder überwiegend schwarz; kräftiger Hakenschnabel; grüne Iris; liegt sehr tief im Wasser; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 94 cm  
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○  
**Graureiher (*Ardea cinerea*)**  
> Grau-weiße Färbung mit schwarzen Oberkopfseiten mit zwei langen schwarzen Nackenfedern; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 102 cm  
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○  
**Silberreiher (*Casmerodius albus*)**  
> Schlangenvogel weißer Reiher mit rotem Schnabel; weiß-grüner Kopf; Flügel gelb; größer als Sturmmöwe; im ersten und zweiten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 60 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○  
**Turmfalke (*Falco tinnunculus*)**  
> Oberseite rotbraun mit dunkleren Schwungfedern; abgerundeter langer Schwanz; Beine gelb mit schwarzen Krallen; graublauer Bartstreif; rüttelt häufig mit langen gefächerten Schwanz; Größe: bis zu 37 cm  
> häufiger Nahrungsgast an Haupt- und Reservebecken



● ○ B  
**Mäusebussard (*Buteo buteo*)**  
> sehr unterschiedliche Färbungen von überwiegend weiß bis gänzlich dunkelbraun; Schnabel schwarz mit gelber Wachshaut; Füße gelb; im Flug mit brettartig gerader Flügelstellung; Größe: bis 58 cm  
> häufiger Nahrungsgast im Reservebecken



○ ➤  
**Seedler (*Haliaeetus albicilla*)**  
> großer kräftiger Greifvogel; weißer, kurzer, keilförmiger Schwanz; starke, gelbe Greiffüße; Gefieder braun; brettartige Flügel; Altvogel mit gelbem Schnabel; Weibchen größer als Männchen; Größe: bis 92 cm  
> seltener Nahrungsgast, meist Jungtiere



● ➤  
**Rotmilan (*Milvus milvus*)**  
> stark gebogelter rostroter Schwanz; braunrotes Gefieder; Kopf grauweiß; ruhiger, gleitender Flug; Weibchen und Männchen ähnlich; Größe: bis 72 cm  
> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



● ○ ➤  
**Lachmöwe (*Larus ridibundus*)**  
> Schwarze Kopf; Schnabel und Beine rot; weiß-graue Gefiederzeichnung; Männchen und Weibchen gleich; Größe: bis 39 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ ➤  
**Silbermöwe (*Larus argentatus*)**  
> gelber klobiger Schnabel mit rotem Fleck; rosa Beine; Gefieder weiß-silbergrau; Iris gelb; größer als Sturmmöwe; im ersten und zweiten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 60 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ ➤  
**Sturmmöwe (*Larus canus*)**  
> Schnabel und Beine gelb; Gefieder weiß mit silbergrauen Flügeln; Flügelspitze schwarz; größer als Lachmöwe; kleiner als Silbermöwe; im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 46 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



○ ➤  
**Heringsmöwe (*Larus fuscus*)**  
> gelber Schnabel mit rotem Fleck; Iris und Beine gelb; Gefieder weiß mit dunkelgrauer Oberseite; Jungvögel im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 56 cm  
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



○ ➤ B  
**Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*)**  
> Kleinvogel des Röhrichts; Männchen mit schwarzem Kopf; Weibchen braun gestreift; Brutet im Röhricht am West- und Südostufer des Hauptbeckens und im Reservebecken; Gesang schilpend; Größe: bis 15,5 cm