

## Vogelarten am Alfsee

> Beobachtungspunkt NuBA im Sommer

● Sommervogel

B Brutvogel

○ Wintervogel

> Durchzügler



● ○ > B

**Höckerschwan (*Cygnus olor*)**

> orangefarbener Schnabel mit schwarzem Höcker und schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß; Größe: bis 160 cm

> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



● ○ > B

**Graugans (*Anser anser*)**

> Kräftiger, oranger Schnabel; braungraues Gefieder; Beine blaß rosa; größte graue Gans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 84 cm

> In allen Becken zu sehen



● ○ >

**Kanadagans (*Branta canadensis*)**

> Kopf und Hals schwarz mit charakteristischem weißen Kinnband; Auge im schwarzen Stirnfeld; Rücken graubraun; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 100 cm

> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



>>>

**Brandgans (*Tadorna tadorna*)**

> markante grünschwarz-weiß-braune Gefiederfärbung; roter Schnabel; Männchen mit Höcker am Schnabelansatz; in der Größe zwischen Gans und Ente; Größe: bis 65 cm

> im Hauptbecken und im Reservebecken auf den Schlammflächen zu sehen



● ○ > B

**Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)**

> auffällige Gans mit braunem Augenfleck; lange rosa Beine; Oberseite grau- bis rotbraun; Unterseite grau; Kopf hellgrau; Größe: bis 73 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ > B

**Stockente (*Anas platyrhynchos*)**

> Schwimmte; graubraunes Gefieder; Männchen mit grünblau schimmerndem Kopf; Beine orange; Federspitzen bei Männchen gekringelt; Weibchen braun; bei beiden auf dem Flügel blaues weiß eingerahmtes Feld; Größe: bis 60 cm

> in allen Becken zu sehen



● ○ > B

**Reihente (*Aythya fuligula*)**

> Tauchente; gelbe Iris; Männchen schwarz-weiß mit schwarzem Federschopf am Hinterkopf; Weibchen dunkelbraun z.T. mit weißem Gefiederring um den Schnabel; Größe: bis 47 cm

> In allen Becken zu sehen



● ○ >

**Schnatterente (*Anas strepera*)**

> orangegelbe Beine; weißes Feld auf dem Flügel; Männchen ist im Prachtkleid dunkelgrau mit schwarzem Körperende sonst braun wie das Weibchen; Größe: bis 56 cm

> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



● ○ >

**Tafelente (*Aythya ferina*)**

> Tauchente; im Schwimmen unter Wasser liegender Schwanz; Männchen mit rostrottem Kopf und Hals; hellgrauem Rückengefieder; rote Iris; Weibchen grau bis graubraun; Iris braun; Größe: bis 49 cm



● ○ >

**Löffelente (*Anas clypeata*)**

> Gründelente; kennzeichnend ist der breite löffelförmige Schnabel; Männchen mit weiß-schwarz-braunem Gefieder; gelbe Iris; Weibchen braun; Bei Nahrungssuche flache Körperhaltung; Größe: bis 52 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ >

**Pfeifente (*Anas penelope*)**

> Kurzer hellgrauer Schnabel; Männchen haben einen rotbraunen Kopf mit gelber Stirn; Körper grau-weiß-schwarz; Brust graurosa; Männchen sehr ruffeudig; Weibchen und Männchen im Schlichtkleid rostrot; Größe: bis 50 cm

> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



● ○ >

**Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)**

> kleinster Taucher; fast einfarbig braun; zur Brutzeit Kehle und Hals rostrot mit markantem gelben Fleck am Schnabelgrund; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 29 cm

> vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen



● ○ > B

**Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)**

> Größter Taucher; Unvergleichbare Federhaube am Kopf; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid Kopfseiten und Nacken braun; im Herbst grau-weißes Federkleid Größe: bis 51 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ > B

**Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)**

> Kleiner Taucher; gelbe Schmuckfedern hinter der roten Iris; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid schwarz-rotbraun; im Herbst grau-weißes Federkleid; Größe: bis 34 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ > B

**Blässhuhn (*Fulica atra*)**

> Rallenart; schwarzes Gefieder; Schnabel und Stirn weiß; kräftige Füße; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm

> in allen Becken zu sehen



● ○ > B

**Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)**

> Gefieder überwiegend schwarz; kräftiger Hakenschnabel; grüne Iris; liegt sehr tief im Wasser; Männchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 94 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ >

**Graureiher (*Ardea cinerea*)**

> Grau-weiße Färbung mit schwarzen Oberkopfseiten mit zwei langen schwarzen Nackenfedern; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 102 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ >

**Silberreiher (*Casmerodius albus*)**

> Schlanker Reiher mit schwarzem Schnabel; Beine grünlich oder schwarz; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 100 cm

> im Reservebecken und an den Ufern des Hauptbeckens zu sehen



● ○ >

**Turmfalke (*Falco tinnunculus*)**

> Oberseite rotbraun mit dunkleren Schwungfedern; abgerundeter langer Schwanz; Beine gelb mit schwarzen Krallen; graublauer Bartstreif; rüttelt häufig mit langen gefächerten Schwanz; Größe: bis zu 37 cm

> häufiger Nahrungsgast an Haupt- und Reservebecken



● ○ > B

**Mäusebussard (*Buteo buteo*)**

> sehr unterschiedliche Färbungen von überwiegend weiß bis gänzlich dunkelbraun; Schnabel schwarz mit gelber Wuchshaut; Füße gelb; im Flug mit breittartig gerader Flügelstellung; Größe: bis 58 cm

> häufiger Nahrungsgast im Reservebecken



● >

**Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)**

> Männchen mit hellgrau-brauner Flügelzeichnung; Weibchen dunkelbraun mit cremeweißer Kopfhaube; beide im Flug mit V-förmiger Flügelstellung; Größe: bis 55 cm

> gelegentlicher Nahrungsgast im Reservebecken oder den Röhrichtzonen des Haupt- und Absetzbecken



● >

**Fischadler (*Pandion haliaetus*)**

> groß; dunkelbraun mit dunkelbraunem Augestreif; Iris gelb; Oberseite dunkelbraun; Unterseite weiß; Federschopf am Hinterkopf; Größe: bis 60 cm

> seltener Nahrungsgast am Hauptbeck



● >

**Rotmilan (*Milvus milvus*)**

> stark gegabelter rostroter Schwanz; braunrotes Gefieder; Kopf grauweiß; ruhiger, gleitender Flug; Weibchen und Männchen ähnlich; Größe: bis 72 cm

> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



● >

**Schwarzmilan (*Milvus migrans*)**

> vorwiegend dunkelbraun gefärbt; Brust und Bauch häufig etwas heller; Kopf und Hals im Adultkleid hellgrau; Nahrungsliebt gemalt; Größe: bis 58 cm

> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



● ○ >

**Lachmöwe (*Larus ridibundus*)**

> Schwarzer Kopf; Schnabel und Beine rot; weiß-graue Gefiederzeichnung; Männchen und Weibchen gleich; Größe: bis 39 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ >

**Silbermöwe (*Larus argentatus*)**

> gelber klobiger Schnabel mit rotem Fleck; rosa Beine; Gefieder weiß-silbergrau; Iris gelb; größer als Sturmmöwe; im ersten und zweiten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 60 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ >

**Sturmmöwe (*Larus canus*)**

> Schnabel und Beine gelb; Gefieder weiß mit silbernen Flügeln; Flügeloberseite schwarz; größer als Lachmöwe; kleiner als Silbermöwe; im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 46 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



○ >

**Heringsmöwe (*Larus fuscus*)**

> gelber Schnabel mit rotem Fleck; Iris und Beine gelb; Gefieder weiß mit dunkelgrauer Oberseite; Jungvögel im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 56 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● >

**Weißstorch (*Ciconia ciconia*)**

> großer Schreitvogel; Gefieder weiß-schwarz; Schnabel und Beine leuchtend rot; Männchen etwas größer als Weibchen; Größe: bis 100 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● >

**Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)**

> Watvogel; braunes Rückengefieder und weiße Unterseite; weißer Keil zwischen Flügel und Brust; wippt oft mit dem Körper; im Flug mit weißem Streifen im Flügel; Größe: 20 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



>>>

**Grünschenkel (*Tringa nebularia*)**

> Watvogel; grüngraue lange Beine; langer, leicht nach oben gebogener Schnabel in grüngrau mit dunkler Spitze; braun-grau-weiß gemustertes Gefieder; Flügeloberseite einfarbig ohne Zeichnung; Größe: bis 34 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



>>>

**Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)**

> Watvogel; langer orangefarbener Schnabel; stark abgesetzte schwarzweiße Gefiederfärbung; rote Beine; Männchen und Weibchen sind nicht zu unterscheiden; Größe: bis 44 cm

> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



>>> B

**Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*)**

> Kleinvogel des Röhrichts; Männchen mit schwarzem Kopf; Weibchen braun gestreift; Brütet im Röhricht am West- und Südostufer des Hauptbeckens und im Reservebecken; Gesang schilpend; Größe: bis 15,5 cm



● >

**Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)**

> braunrote Kehle und Stirn sowie tief gegabelter Schwanz; Oberseite und Brustband blauschwarz; Unterseite rahmweiß; Größe: 21 cm

> hauptsächlich im Frühjahrzug, sitzen dann oft im Schilf oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken



>>>

**Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*)**

> schwach gegabelter Schwanz und weißer Bürzel; Kopf, Rücken, Flügeloberseiten und Schwanz blauschwarz; Unterseite melnweiß; Größe: 15 cm

> hauptsächlich im Frühjahrzug, sitzen dann oft im Schilf oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken



>>>

**Mauersegler (*Apus apus*)**

> Großer Segler; lange sichelförmige Flügel; kurzer gegabelter Schwanz; Gefieder schwarzbraun; weißer Kehlfleck; kurzer schwarzer Schnabel; Größe: bis zu 19 cm

> Nahrungsgast zu Mückenhochzeiten. Fliegt oft dicht an Spaziergängern vorbei