

| Vogelarten am Alfsee | |
|--|---|
| > Beobachtungspunkt NuBA im Herbst | |
| <input checked="" type="radio"/> Sommervogel | <input type="radio"/> Wintervogel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brutvogel | <input checked="" type="checkbox"/> Durchzügler |
|  | Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>) > orangeroter Schnabel mit schwarzem Höcker und schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß; Größe: bis 160 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen |
|  | Blässgans (<i>Anser albifrons</i>) > Blässe über dem kleinen, orangefarbenen Schnabel; Beine orange; erwachsene Vögel mit schwarzen Streifen am Bauch; kleiner als Graugans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 78 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen |
|  | Graugans (<i>Anser anser</i>) > Kräftiger, orangener Schnabel; braungraues Gefieder; Beine blaß rosa; größte graue Gans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 84 cm > In allen Becken zu sehen |
|  | Saatgans (<i>Anser fabalis</i>) > schwarz-orangefarbener Schnabel; Hals und Kopf dunkler gefärbt; Beine orange; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 88 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen |
|  | Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>) > Kopf und Hals schwarz mit charakteristischem weißen Kinnband; Auge im schwarzen Stirnfeld; Rücken graubraun; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 100 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen |
|  | Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>) > Schwimmte; graubraunes Gefieder; Männchen mit grünblau schimmerndem Kopf; Beine orange; Federspitzen bei Männchen gekringelt; Weibchen braun; bei beiden auf dem Flügel blaues weiß eingerahmtes Feld; Größe: bis 60 cm > in allen Becken zu sehen |
|  | Reihente (<i>Aythya fuligula</i>) > Tauchente; gelbe Iris; Männchen schwarz-weiß mit schwarzem Federschopf am Hinterkopf; Weibchen dunkelbraun z.T. mit weißem Gefiederring um den Schnabel; Größe: bis 47 cm > In allen Becken zu sehen |
|  | Schnatterente (<i>Anas strepera</i>) > orangegelbe Beine; weißes Feld auf dem Flügel; Männchen ist im Prachtkleid dunkelgrau mit schwarzem Körperende sonst braun wie das Weibchen; Größe: bis 56 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen |
|  | Tafelente (<i>Aythya ferina</i>) > Tauchente; im schwimmen unter Wasser liegender Schwanz; Männchen mit rostrottem Kopf und Hals; hellgrauem Rückengefieder; rote Iris; Weibchen grau bis graubraun; Iris braun; Größe: bis 49 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen |
|  | Krickente (<i>Anas crecca</i>) > Kleine Schwimmte; Männchen haben einen kastanienbraunen Kopf mit grün glänzendem Band am Auge; gelbes Feld an den Hinterflanken; zur Brutzeit ruffreudig; Weibchen braun mit grünem Feld auf dem Flügel; Größe: bis 38 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen |
|  | Löffelente (<i>Anas clypeata</i>) > Gründelente; kennzeichnend ist der breite löffelförmige Schnabel; Männchen mit buntem weiß-schwarz-braunem Gefieder; gelbe Iris; Weibchen braun; Bei Nahrungssuche flache Körperhaltung; Größe: bis 52 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen |
|  | Pfeifente (<i>Anas penelope</i>) > Kurzer hellgrauer Schnabel; Männchen haben einen rotbraunen Kopf mit gelber Stirn; Körper grau-weiß-schwarz; Brust graurosa; Männchen sehr ruffreudig; Weibchen und Männchen im Schlichtkleid rostrot; Größe: bis 50 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen |
|  | Spießente (<i>Anas acuta</i>) > Gründelente; Männchen weiß mit braun-weißer Halszeichnung und langem schwarz-weißer Weibchen braun mit weniger stark ausgeprägtem Spieß; Größe: bis 62 cm > Seltener Gast im Haupt- oder Reservebecken |
|  | Schellente (<i>Bucephala clangula</i>) > Tauchente; gedrungener Körper; dreieckiger Kopf; Männchen schwarz-weiß mit weißem Fleck oberhalb des Schnabels; gelbe Iris; Weibchen unscheinbarer graubraun; Größe: bis 48 cm > vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen |
|  | Zwergsäger (<i>Mergellus albellus</i>) > Kleiner Säger; Männchen weiß mit feinen schwarzen Sägen; Weibchen am Kopf und Nacken rotbraun; Kehle weiß; Rücken grau; Größe: bis 44 cm > im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen |
|  | Gänssäger (<i>Mergus merganser</i>) > Großer Säger; langer, roter Hakenschnabel; Männchen weiß mit grünblau schimmerndem Kopf und Hals; Rücken schwarz; Weibchen am Kopf und Hals rotbraun; Körper hellgrau; markanter Schopf am Hinterkopf; Größe: 68 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen |
|  | Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>) > kleinster Taucher; fast einfarbig braun; zur Brutzeit Kehle und Hals rostrot mit markantem gelben Fleck am Schnabelgrund; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 29 cm > vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen |
|  | Haubentaucher (<i>Podiceps cristatus</i>) > Größter Taucher; Unverwechselbare Federhaube am Kopf; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid Kopfscheitel und Nacken braun; im Herbst grau-weißes Federkleid Größe: bis 51 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen |
|  | Schwarzhalstaucher (<i>Podiceps nigricollis</i>) > Kleiner Taucher; gelbe Schmuckfedern hinter der roten Iris; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid schwarz-rotbraun; im Herbst grau-weißes Federkleid; Größe: bis 34 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen |
|  | Rothalstaucher (<i>Podiceps grisegena</i>) > Taucher; gelbe Schnabelbasis; zur Paarungszeit Kopfseiten und Kehle weiß mit rotem Hals und schwarzem Oberkopf; Gefieder graubraun; Größe: bis 46 cm > seltener Gast im Hauptbecken |
|  | Blässhuhn (<i>Fulica atra</i>) > Rallenart; schwarzes Gefieder; Schnabel und Stirn weiß; kräftige Füße; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm > in allen Becken zu sehen |
|  | Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>) > Gefieder überwieiegend schwarz; kräftiger Hakenschnabel; grüne Iris; liegt sehr tief im Wasser; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 94 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen |
|  | Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>) > Grau-weiße Färbung mit schwarzen Oberkopfseiten mit zwei langen schwarzen Nackenfedern; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 102 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen |
|  | Silberreiher (<i>Casmerodius albus</i>) > Schlanker weißer Reiher mit gelbem Schnabel; Beine grünlich oder schwarz; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 100 cm > im Reservebecken und an den Ufern des Hauptbeckens zu sehen |
|  | Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>) > Oberseite rotbraun mit dunkleren Schwungfedern; abgerundeter langer Schwanz; Beine gelb mit schwarzen Krallen; graublauer Bartstreif; rüttelt häufig mit langen gefächerten Schwanz; Größe: bis zu 37 cm > häufiger Nahrungsgast an Haupt- und Reservebecken |
| | Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>) > sehr unterschiedliche Färbungen von überwiegend weiß bis gänzlich dunkelbraun; Schnabel schwarz mit gelber Wachshaut; Füße gelb; im Flug mit brettartig gerader Flügelstellung; Größe: bis 58 cm > häufiger Nahrungsgast im Reservebecken |
| | Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>) > Kopf weiß mit markantem braunem Augestreif; Iris gelb; Oberseite dunkelbraun; Unterseite weiß; Federschopf am Hinterkopf; Größe: bis 60 cm > seltener Nahrungsgast am Hauptbecken |
| | Seedler (<i>Haliaeetus albicilla</i>) > großer kräftiger Greifvogel; weißer, kurzer, keilförmiger Schwanz; starke, gelbe Greiffüße; Gefieder braun; brettartige Flügel; Altvögel mit gelbem Schnabel; Weibchen größer als Männchen; Größe: bis 92 cm > seltener Nahrungsgast, meist Jungtiere |
| | Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>) > stark gebogelter rostrer Schwanz; braunrotes Gefieder; Kopf grauweiß; ruhiger, gleitender Flug; Weibchen und Männchen ähnlich; Größe: bis 72 cm > seltener Nahrungsgast am Hauptbecken |
| | Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>) > Schwarzer Kopf; Schnabel und Beine rot; weiß-graue Gefiederzeichnung; Männchen und Weibchen gleich; Größe: bis 39 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen |
| | Silbermöwe (<i>Larus argentatus</i>) > gelber klobiger Schnabel mit rotem Fleck; rosa Beine; Gefieder weiß-silbergrau; Iris gelb; größer als Sturmmöwe; im ersten und zweiten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 60 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen |
| | Sturmmöwe (<i>Larus canus</i>) > Schnabel und Beine gelb; Gefieder weiß mit silbergrauen Flügeln; Flügelspitze schwarz; größer als Lachmöwe; kleiner als Silbermöwe; im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 46 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen |
| | Heringsmöwe (<i>Larus fuscus</i>) > gelber Schnabel mit dunkel Fleck; Iris und Beine gelb; Gefieder weiß mit dunkelgrauer Oberseite; Jungvögel im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 56 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen |
| | Flussuferläufer (<i>Actitis hypoleucos</i>) > Watvogel; braunes Rückengefieder und weiße Unterseite; weißer Keil zwischen Flügel und Brust; wippt oft mit dem Körperende; im Flug mit weißem Streifen im Flügel; Größe: 20 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen |
| | Grünschenkel (<i>Tringa nebularia</i>) > Watvogel; grüngraue lange Beine; langer, leicht nach oben gebogener Schnabel in grüngrau mit dunkler Spitze; braun-grau-weiß gemustertes Gefieder; Flügeloberseite einfarbig ohne Zeichnung; Größe: bis 34 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen |
| | Austernfischer (<i>Haematopus ostralegus</i>) > Watvogel; langer orangeroter Schnabel; stark abgesetzte schwarzweiße Gefiederfärbung; rote Beine; Männchen und Weibchen sind nicht zu unterscheiden; Größe: bis 44 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen |
| | Rohrhammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>) > Kleinvogel des Röhrichts; Männchen mit schwarzem Kopf; Weibchen braun gestreift; Brütet im Röhricht am West- und Südostufer des Hauptbeckens und im Reservebecken; Gesang schilpend; Größe: bis 15,5 cm |
| | Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>) > braunrote Kehle und Stirn über tief gebogelter Schwanz; Oberseite und Brustband blauschwarz; Unterseite rahmweiß; Größe: 21 cm > hauptsächlich im Frühjahrzug, sitzen dann oft im Schilf oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken |
| | Mehlschwalbe (<i>Delichon urbicum</i>) > schwach gebogelter Schwanz und weißer Bürzel; Kopf, Rücken, Flügeloberseiten und Schwanz blauschwarz; Unterseite mahlweiß; Größe: 15 cm > hauptsächlich im Frühjahrzug, sitzen dann oft im Schilf oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken |
| | Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>) > Kleine europäische Schwalbenart; Oberseite matt graubraun; Unterseite weiß mit graubraunem Brustband; Schwanz leicht gebogelt; Größe: bis 13 cm > hauptsächlich im Frühjahrzug, sitzen dann oft im Schilf oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken |