

Vogelarten am Alfsee

> Beobachtungspunkt Reservebecken im Frühling

- Sommervogel
- Wintervogel
- Brutvogel
- Durchzügler



Höckerschwan (*Cygnus olor*)
> orangeroter Schnabel mit schwarzem Höcker und schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß;
Größe: bis 160 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



Blässgans (*Anser albifrons*)
> Blässe über dem kleinen, orangefarbenen Schnabel; Beine orange; erwachsene Vögel mit schwarzen Streifen am Bauch; kleiner als Graugans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 78 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Graugans (*Anser anser*)
> Kräftiger, oranger Schnabel; braungraues Gefieder; Beine blaß rosa; größte graue Gans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 84 cm
> In allen Becken zu sehen



Kanadagans (*Branta canadensis*)
> Kopf und Hals schwarz mit charakteristischem weißen Kinnband; Auge im schwarzen Stirnfeld; Rücken graubraun; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 100 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



Brandgans (*Tadorna tadorna*)
> markante grün-schwarz-weiß-braune Gefiederfärbung; roter Schnabel; Männchen mit Höcker am Schnabelansatz; in der Größe zwischen Gans und Ente; Größe: bis 65 cm
> im Hauptbecken und im Reservebecken auf den Schlammflächen zu sehen



Rostgans (*Tadorna ferruginea*)
> rotbraunes Gefieder; Kopf creme; Schwingen und Schwanz schwarz; Größe: bis 70 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)
> auffällige Gans mit braunem Augenfleck; lange rosa Beine; Oberseite grau- bis rotbraun; Unterseite grau; Kopf hellgrau; Größe: bis 73 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Stockente (*Anas platyrhynchos*)
> Schwimmte; graubraunes Gefieder; Männchen mit grünblau schimmerndem Kopf; Beine orange; Federspitzen bei Männchen gekringelt; Weibchen braun; bei beiden auf dem Flügel blaues weiß eingerahmtes Feld; Größe: bis 60 cm
> in allen Becken zu sehen



Reiherente (*Aythya fuligula*)
> Tauchente; gelbe Iris; Männchen schwarz-weiß mit schwarzem Federschopf am Hinterkopf; Weibchen dunkelbraun z.T. mit weißem Gefiederring um den Schnabel; Größe: bis 47 cm
> In allen Becken zu sehen



Schnatterente (*Anas strepera*)
> orangegelbe Beine; weißes Feld auf dem Flügel; Männchen mit gelber Stirn; Weibchen braun mit grünem Körperende sonst braun wie das Weibchen; Größe: bis 56 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



Tafelente (*Aythya ferina*)
> Tauchente; im schwimmen unter Wasser liegender Schwanz; Männchen mit rostrottem Kopf und Hals; hellgrauem Rückengefieder; rote Iris; Weibchen grau bis graubraun; Iris braun; Größe: bis 49 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



Krickente (*Anas crecca*)
> Kleine Schwimmte; Männchen haben einen kastanienbraunen Kopf mit grün glänzendem Band am Auge; gelbes Feld an den Hinterflanken; zur Brutzeit ruffreudig; Weibchen braun mit grünem Feld auf dem Flügel; Größe: bis 38 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



Knäkente (*Anas querquedula*)
> Kleine Schwimmte; Männchen mit breitem weißen Überaugenstreif am braunen Kopf; grauweißes Rückengefieder; Weibchen braun mit dunkelbrauner Kappe am Kopf; Größe: bis 41 cm
> vorrangig im Reserve- und Absetzbecken zu sehen



Löffelente (*Anas clypeata*)
> Gründelente; kennzeichnend ist die breite löffelförmige Schnabel; Männchen mit buntem weiß-schwarz-braunem Gefieder; gelbe Iris; Weibchen braun; Bei Nahrungssuche flache Körperhaltung; Größe: bis 52 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



Pfeifente (*Anas penelope*)
> Kurzer hellgrauer Schnabel; Männchen haben einen rotbraunen Kopf mit gelber Stirn; Körper grau-weiß-schwarz; Brust graubraun; Männchen sehr ruffreudig; Weibchen und Weibchen im Schlichtkleid rostrot; Größe: bis 50 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)
> Größter Taucher; Unverwechselbare Federhaube am Kopf; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid Kopfseiten und Nacken braun; im Herbst grau-weißes Federkleid; Größe: bis 51 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



Blässhuhn (*Fulica atra*)
> Rallenart; schwarzes Gefieder; Schnabel und Stirn weiß; kräftige Füße; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm
> in allen Becken zu sehen



Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)
> Rallenart; rote Stirnplatte; roter Schnabel mit gelber Spitze; schwarzes Gefieder; kräftige Füße; Weibchen etwas größer als Männchen; Größe: bis 33 cm
> vorrangig am nordwestlichen Ufer des Hauptbeckens



Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)
> Gefieder überwiegend schwarz; kräftiger Hakenschnabel; grüne Iris; liegt sehr tief im Wasser; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 94 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Graureiher (*Ardea cinerea*)
> Grau-weiße Färbung mit schwarzen Oberkopfseiten mit zwei langen schwarzen Nackenfedern; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 102 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Silberreiher (*Casmerodius albus*)
> Schlanker weißer Reiher mit gelbem Schnabel; Beine grünlich oder schwarz; mit Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 100 cm
> im Reservebecken und an den Ufern des Hauptbeckens zu sehen



Turmfalke (*Falco tinnunculus*)
> Oberseite rotbraun mit dunkleren Schwungfedern; abgerundeter langer Schwanz; starke, gelbe Greiffüße; häufig mit langen gefächerten Schwanz; Größe: bis zu 37 cm
> häufiger Nahrungsgast an Haupt- und Reservebecken



Mäusebussard (*Buteo buteo*)
> sehr unterschiedliche Färbungen von überwiegend weiß bis gänzlich dunkelbraun; Schnabel schwarz mit gelber Spizhaute; Füße gelb; im Flug mit breittartig gerader Flügelstellung; Größe: bis 58 cm
> häufiger Nahrungsgast im Reservebecken



Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
> Mäherweide (hellgrau-bräunlich) mit schwarzer Zeichnung; Weibchen dunkelbraun mit cremefarbener Kopfhaut; beide im Flug mit V-förmiger Flügelstellung; Größe: bis 55 cm
> gelegentlicher Nahrungsgast im Reservebecken oder den Röhrichtzonen des Haupt- und Absetzbeckens



Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)
> großer kräftiger Greifvogel; weißer, kurzer, keilförmiger Schwanz; starke, gelbe Greiffüße; Gefieder braun; breittartige Flügel; Altvogel mit gelbem Schnabel; Weibchen größer als Männchen; Größe: bis 92 cm
> seltener Nahrungsgast, meist Jungtiere



Rotmilan (*Milvus milvus*)
> stark gebogelter rostroter Schwanz; braunrotes Gefieder; Kopf grauweiß; ruhiger, gleitender Flug; Weibchen und Männchen ähnlich; Größe: bis 72 cm
> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
> vorwiegend dunkelbraun gefärbt; Brust und Bauch häufig etwas heller; Kopf und Hals im Adultkleid hellgrau; Schwanz leicht gebogelt; Größe: bis 58 cm
> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



Lachmöwe (*Larus ridibundus*)
> schwarze Kopf- und Schnabel und Beine rot; weiß-grauer Gefiederzeichnung; Männchen und Weibchen gleich; Größe: bis 39 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen

Silbermöwe (*Larus argentatus*)
> gelber klobiger Schnabel mit rotem Gefieder; rosa Beine; Gefieder weiß-silbergrau; Iris gelb; größer als Sturmmöwe; im ersten und zweiten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 60 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen

Sturmmöwe (*Larus canus*)
> Schnabel und Beine gelb; Gefieder weiß mit silbergrauen Flügeln; Flügelspitze schwarz; größer als Lachmöwe; kleiner als Silbermöwe; im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 46 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)
> schwarz-graues Gefieder; Schnabel und Beine dunkel; lange, schlanke Flügel; wellenförmig, schwebendes Flugbild; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen während des Heimzuges im Frühjahr

Fluss-Seeschwalbe (*Sterna hirundo*)
> Oberseite grau mit schwarzer Haube; Unterseite hellgrau; roter Schnabel mit schwarzer Schnabelspitze; Beine rot; Schwanz tief gebogelt; Größe: bis zu 37 cm
> Seltener Gast am Hauptbecken

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
> großer Schreitvogel; Gefieder weiß-schwarz; Schnabel und Beine leuchtend rot; Männchen etwas größer als Weibchen; Größe: bis 100 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)
> Watvogel; schwarz-weißes Gefieder; metallisch grün-violett glänzend; Federschoß am Hinterkopf; Federschopf beim Männchen größer; Kehle und Brust beim Männchen schwarz; beim Weibchen meist mit weißen Flecken; Größe: bis 31 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)
> ansehliger Watvogel; Rücken graubraun; unterseits weiß; im Prachtkleid: Schnabel orange mit schwarzer Spitze, Beine orange, schwarz geschlossenes Brustband, schwarzes Stirnband; Größe: 20 cm
> seltener Gast im Hochsommer an den Durchlässen der Überlaufschwelle

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)
> Watvogel; braunes Rückengefieder und weiße Unterseite; weißer Keil zwischen Flügel und Brust; wippt oft mit dem Körperende; im Flug mit weißem Streifen im Flügel; Größe: 20 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)
> Watvogel; Schnabel dunkel und am Ende leicht nach unten gebogen; Beine olivgrün bis schwarz; Augen dunkel; Bauch und Brust weiß; Oberseite graubraun; im Prachtkleid typischer schwarzer Brustfleck und Federn auf Oberseite variabel rotbraun; Größe: 21 cm
> seltener Gast im Hochsommer der Überlaufschwelle

Rotschenkel (*Tringa totanus*)
> Watvogel; lange rote Beine; roter gerader Schnabel mit dunkler Spitze; braun-grau gemustertes Gefieder; langer Körper oft wippend; Flügeloberseite mit markanter weißer Zeichnung; Größe: bis 27 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)
> Watvogel; grüngraue lange Beine; langer, leicht nach oben gebogener Schnabel in längergrau mit dunkler Spitze; braun-grau-weiß gemustertes Gefieder; Flügeloberseite einfarbig ohne Zeichnung; Größe: bis 34 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)
> Watvogel; lange rote Beine; langer an der Spitze leicht abwärts gebogener Schnabel; nur Unter-schnabelbasis rot; grau schattiertes bis schwarzes Gefieder; Flügeloberseite dunkel, einfarbig; Männchen und Weibchen gleich; Größe: bis 33 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)
> Watvogel; graugrüne Beine; dunkle Oberseite mit hellen Flecken; weiße Unterseite mit scharf abgetrennter dunkler Brust; weißer Augenring; Größe: bis 33 cm
> im Reservebecken und evtl. an der Überlaufschwelle zu sehen

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)
> Watvogel; zierlicher Körperbau; Oberseite braungrau mit hellen Flecken; Bauch weiß; mittellanger Schnabel; markanter weißer Überaugenstreif; gelbgrüne lange Beine; Größe: bis 21 cm
> Im Reservebecken und evtl. an der Überlaufschwelle zu sehen

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)
> Watvogel; mittellanger, abwärts gebogener Schnabel; bunter aufstellbarer Kragen; Rücken-gefieder geschuppt; Gefieder und Beinfarbe variabel; führen Balztanz auf; Männchen größer als Weibchen; Größe: Männchen bis 32 cm, Weibchen bis 26 cm
> im Reservebecken und an der Überlaufschwelle zu sehen

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)
> Watvogel; sehr großer, gebogener Schnabel; graubraun gemustertes Gefieder; Weibchen größer als Männchen; flötenes Stimme; Größe: bis 57 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen

Bekassine (*Gallinago gallinago*)
> Watvogel; langer, gerader Schnabel; kurze Beine; braun gemustertes Gefieder mit hellen Längsstreifen an Kopf und Oberseite; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 28 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)
> Watvogel; langer orangefarbener Schnabel; stark abgesetzte schwarzweiße Gefiederfärbung; rote Beine; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 44 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen

Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*)
> Kleinvogel des Röhrichts; Männchen mit schwarzem Kopf; Weibchen braun gestreift; Brutet im Röhricht am West- und Südostufer des Hauptbeckens und im Reservebecken; Gesang schilpend; Größe: bis 15,5 cm

Sumpfröhrsänger (*Acrocephalus palustris*)
> Kleinvogel der feuchten, üppigen Hochstaudenflur; Oberseite einfarbig, graubraun; Unterseite gelblich-weiß; Kehle weißlicher; Federn am Hinterkopf häufig aufgestellt; imitiert Rufe anderer Vögel und mischt sie mit eigenen Strophen; Größe: bis 15 cm
> Im Reservebecken zu hören

Teichröhrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)
> Röhrichtvogel; Oberseite einfarbiges, graubraunes Gefieder; Unterseite beigeweiß; spitzer Kopf mit flachem Scheitel; leise-schwatzender Gesang; Gesangshauptteil mit vielen tire tire tracke tracke Lauten; Größe: bis 14 cm

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)
> braunrote Kehle und Stirn sowie tief gebogelter Schwanz; Oberseite und Brustband blauschwarz; Unterseite rahmweiß; Größe: 21 cm
> Hauptseitschiff im Frühjahr; sitzen dann oft im Schilf oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken

Mauersegler (*Apus apus*)
> Großer Segler; lange sichelförmige Flügel; kurzer gebogelter Schwanz; Gefieder schwarzbraun; weißer Kehlfleck; kurzer schwarzer Schnabel; Größe: bis zu 19 cm
> Nahrungsgast zu Mückenhochzeiten. Fliegt oft dicht an Spaziergängern vorbei