

Vogelarten am Alfsee

> Beobachtungspunkt Reservebecken im Sommer

Sommervogel

Brutvogel

Wintervogel

Durchzügler



Höckerschwan (*Cygnus olor*)

> orangeroter Schnabel mit schwarzem Höcker und schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß; Größe: bis 160 cm

> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



Graugans (*Anser anser*)

> Kräftiger, oranger Schnabel; braungraues Gefieder; Beine blaß rosa; größte graue Gans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 84 cm

> In allen Becken zu sehen



Saatgans (*Anser fabalis*)

> schwarz-orangefarbener Schnabel; Hals und Kopf dunkler gefärbt; Beine orange; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 88 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Kanadagans (*Branta canadensis*)

> Kopf und Hals schwarz mit charakteristischem Rücken Kinnband; Auge im schwarzen Stirnfeld; Rücken graubraun; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 100 cm

> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)

> auffällige Gans mit braunem Augenfleck; lange rosa Beine; Oberseite grau- bis rotbraun; Unterseite grau; Kopf hellgrau; Größe: bis 73 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Stockente (*Anas platyrhynchos*)

> Schwimmente; graubraunes Gefieder; Männchen mit grünblau schimmerndem Kopf; Beine orange; Federspitzen bei Männchen gekringelt; Weibchen braun; bei beiden auf dem Flügel blaues weiß eingerahmtes Feld; Größe: bis 60 cm

> in allen Becken zu sehen



Reiherente (*Aythya fuligula*)

> Tauchente; gelbe Iris; Männchen schwarz-weiß mit schwarzem Federschopf am Hinterkopf; Weibchen dunkelbraun z.T. mit weißem Gefiederring um den Schnabel; Größe: bis 47 cm

> In allen Becken zu sehen



Schnatterente (*Anas strepera*)

> orangegelbe Beine; weißes Feld auf dem Flügel; Männchen ist im Prachtkleid dunkelgrau mit schwarzem Körperende sonst braun wie das Weibchen; Größe: bis 56 cm



Tafelente (*Aythya ferina*)

> Tauchente; im Schwimmen unter Wasser liegender Schwanz; Männchen mit rostrottem Kopf und Hals; hellgrauem Rückengefieder; rote Iris; Weibchen grau bis graubraun; Iris braun; Größe: bis 49 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

> Größter Taucher (Unverwechselbare Federhaube am Kopf; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid Kopfseiten und Nacken braun; im Herbst grau-weißes Federkleid; Größe: bis 51 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



Blässhuhn (*Fulica atra*)

> Rallenart; schwarzes Gefieder; Schnabel und Stirn weiß; kräftige Füße; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm

> in allen Becken zu sehen



Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

> Rallenart; rote Stirnplatte; roter Schnabel mit gelber Spitze; schwarzbraunes Gefieder; kräftige Füße; Weibchen etwas größer als Männchen; Größe: bis 33 cm

> vorrangig am nordwestlichen Ufer des Hauptbeckes



Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

> Gefieder überwiegend schwarz; kräftiger Hakenschnabel; grüne Iris; liegt sehr tief im Wasser; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 94 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Graureiher (*Ardea cinerea*)

> Grau-weiße Färbung mit schwarzen Oberkopfseiten mit zwei langen schwarzen Nackenfedern; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 102 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Silberreiher (*Casmerodius albus*)

> Schlanker weißer Reiher mit gelbem Schnabel; Beine grünlich oder schwarz; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 100 cm

> im Reservebecken und an den Ufern des Hauptbeckens zu sehen



Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

> Oberseite rotbraun mit dunkleren Schwungfedern; abgerundeter langer Schwanz; Beine gelb mit schwarzen Krallen; graublauer Bartstreif; rüttelt häufig mit langen gefächerten Schwanz; Größe: bis zu 37 cm

> häufiger Nahrungsgast an Haupt- und Reservebecken



Mäusebussard (*Buteo buteo*)

> sehr unterschiedliche Färbungen von überwiegend weiß bis gänzlich dunkelbraun; Schnabel schwarz mit gelber Wachshaut; Füße gelb; im Flug mit brettlartig gerader Flügelstellung; Größe: bis 58 cm

> häufiger Nahrungsgast im Reservebecken



Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

> Männchen mit hellgrau-brauner Flügelzeichnung; Weibchen dunkelbraun mit cremeweißer Kopfhaube; beide im Flug mit V-förmiger Flügelstellung; Größe: bis 55 cm

> gelegentlicher Nahrungsgast im Reservebecken oder den Röhrichtzonen des Haupt- und Absetzbecken



Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

> großer kräftiger Greifvogel; weißer, kurzer, keilförmiger Schwanz; starke, gelbe Greiffüße; Gefieder braun; brettlartige Flügel; Altvogel mit gelbem Schnabel; Weibchen größer als Männchen; Größe: bis 92 cm

> seltener Nahrungsgast, meist Jungtiere



Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

> Schwarzer Kopf; Schnabel und Beine rot; weiß-graue Gefiederzeichnung; Männchen und Weibchen gleich; Größe: bis 39 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



Fluss-Seeschwalbe (*Sterna hirundo*)

> Oberseite grau mit schwarzer Haube; Unterseite hellgrau; roter Schnabel mit schwarzer Schnabelspitze; Beine rot; Schwanz tief gegabelt; Größe: bis zu 37 cm

> Seltener Gast am Hauptbecken



Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

> großer Schreitvogel; Gefieder weiß-schwarz; Schnabel und Beine leuchtend rot; Männchen etwas größer als Weibchen; Größe: bis 100 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

> Watvogel; schwarz-weißes Gefieder; metallisch grün-violett glänzend; Federschopf am Hinterkopf; Federschopf beim Männchen größer; Kehle und Brust beim Männchen schwarz; beim Weibchen meist mit weißen Flecken; Größe: bis 31 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Rohrammer (*Emberiza schoenicus*)

> Kleinvogel des Röhrichts; Männchen mit schwarzem Kopf; Weibchen braun gestreift; Brutet im Röhricht am West- und Südostufer des Hauptbeckens und im Reservebecken; Gesang schilpend; Größe: bis 15,5 cm



Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

> Kleinvogel der feuchten, üppigen Hochstaudenflur; Oberseite einfarbig, graubraun; Unterseite gelblich-weiß; Kehle weißlicher; Federn am Hinterkopf häufig aufgestellt; imitiert Rufe anderer Vögel und mischt sie mit eigenen Strophen; Größe: bis 15 cm

> Im Reservebecken zu hören



Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

> Röhrichtvogel; Oberseite einfarbiges, graubraunes Gefieder; Unterseite beigeweiß; spitzer Kopf mit flachem Scheitel; leise-schwatzender Gesang; Gesangshauptteil mit vielen tire tire trecke trecke Lauten; Größe: bis 14 cm



Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

> braunrote Kehle und Stirn sowie tief gegabelter Schwanz; Oberseite und Brustband blauschwarz; Unterseite rahmweiß; Größe: 21 cm

> hauptsächlich im Frühjahrzug, sitzen dann oft im Schil oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken



Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*)

> schwach gegabelt Schwanz und weißer Bürzel; Kopf, Rücken, Flügeloberseiten und Schwanz blauschwarz; Unterseite mehllweiß; Größe: 15 cm

> Hauptächlich im Frühjahrzug, sitzen dann oft im Schil oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken



Mauersegler (*Apus apus*)

> Großer Segler; lange sichelförmige Flügel; kurzer gegabelter Schwanz; Gefieder schwarzbraun; weißer Kehlfleck; kurzer schwarzer Schnabel; Größe: bis zu 19 cm

> Nahrungsgast zu Mückenhochzeiten. Fliegt oft dicht an Spaziergängern vorbei