

Vogelarten am Alsee	
> Beobachtungspunkt Reservebecken im Herbst	
<input checked="" type="radio"/> Sommervogel	<input type="radio"/> Wintervogel
<input checked="" type="checkbox"/> Brutvogel	<input checked="" type="checkbox"/> Durchzügler
	<p>Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > orangeroter Schnabel (Cygnus olor) > Höcker und schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß; Größe: bis 160 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen
	<p>Singschwan (<i>Cygnus cygnus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > gelber Schnabel mit schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß; Hals deutlich gerader als beim Höckerschwan; Größe: bis 160 cm > vorrangig von November bis Februar vorrangig morgens und abends in der Dämmerung im Reservebecken zu sehen
	<p>Zwergschwan (<i>Cygnus bewickii</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Gefieder weiß; etwas kompakter als Singschwan; an der Schnabelbasis rechteckiges oder rundes gelbes Feld; Gelbanteil geringer als Schwarzanteil; Größe: bis 127 cm > vorrangig von Nov bis Feb morgens und abends in der Dämmerung im Reservebecken zu sehen
	<p>Blässgans (<i>Anser albifrons</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Blässe über dem kleinen, orangefarbenen Schnabel; Beine orange; erwachsene Vögel mit schwarzen Streifen am Bauch; kleiner als Graugans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 78 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen
	<p>Graugans (<i>Anser anser</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Kräftiger, oranger Schnabel; braungraues Gefieder; Beine blaß rosa; größte graue Gans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 84 cm > In allen Becken zu sehen
	<p>Saatgans (<i>Anser fabalis</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > schwarz-orangefarbener Schnabel; Hals und Kopf dunkler gefärbt; Beine orange; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 88 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen
	<p>Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Kopf und Hals schwarz mit charakteristischem weißen Kinband; Auge im schwarzen Stirnfeld; Rücken graubraun; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 100 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen
	<p>Weißwangengans (<i>Branta leucopsis</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Wange und Stirn weiß; Scheitel und Hals schwarz; Auge im weißen Stirnfeld; kleiner schwarzer Schnabel; Oberseite grauschwarze Bänderung; Größe: bis 70 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen
	<p>Brandgans (<i>Tadorna tadorna</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > markante grünschwartz-weiß-braune Gefiederfärbung; roter Schnabel; Männchen mit Höcker am Schnabelansatz; in der Größe zwischen Gans und Ente; Größe: bis 65 cm > im Hauptbecken und im Reservebecken auf den Schlammflächen zu sehen
	<p>Rostgans (<i>Tadorna ferruginea</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > rotbraunes Gefieder; Kopf creme; Schwingen und Schwanz schwarz; Größe: bis 70 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen
	<p>Nilgans (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > auffällige Gans mit braunem Augenfleck; lange rosa Beine; Oberseite grau- bis rotbraun; Unterseite grau; Kopf hellgrau; Größe: bis 73 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen
	<p>Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Schwimmte; graubraunes Gefieder; Männchen mit grünblau schimmerndem Kopf; Beine orange; Federspitzen bei Männchen gekringelt; Weibchen braun; bei beiden auf dem Flügel blaues weiß eingerahmtes Feld; Größe: bis 60 cm > in allen Becken zu sehen
	<p>Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tauchente; im Schwimmen unter Wasser liegender Schwanz; Männchen mit hinterem Kopf und Hals schwarz; Weibchen dunkelbraun z.T. mit weißem Gefiederring um den Schnabel; Größe: bis 47 cm > In allen Becken zu sehen
	<p>Schnatterente (<i>Anas strepera</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > orangegelbe Beine; weißes Feld auf dem Flügel; Männchen ist im Prachtkleid dunkelgrau mit schwarzem Körperende sonst braun wie das Weibchen; Größe: bis 56 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen
	<p>Tafelente (<i>Aythya ferina</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tauchente; im Schwimmen unter Wasser liegender Schwanz; Männchen mit rostrotm Kopf und Hals; hellgrauem Rückengefieder; rote Iris; Weibchen grau bis braun; Iris gelb; Größe: bis 49 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen
	<p>Krickente (<i>Anas crecca</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Kleine Schwimmte; Männchen haben einen kastanienbraunen Kopf mit grün glänzendem Band am Auge; gelbes Feld an den Hinterflanken; zur Brutzeit ruffreudig; Weibchen braun mit grünem Feld auf dem Flügel; Größe: bis 38 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen
	<p>Knäkente (<i>Anas querquedula</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Kleine Schwimmte; Männchen mit breitem weißen Überaugenstreif am braunen Kopf; graubraunes Rückengefieder; Männchen braun mit dunkelbrauner Kappe am Kopf; Größe: bis 41 cm > vorrangig im Reserve- und Absetzbecken zu sehen
	<p>Löffelente (<i>Anas clypeata</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Gründelente; kennzeichnend ist der breite löffelförmige Schnabel; Männchen mit buntem weiß-schwarz-braunem Gefieder; gelbe Iris; Weibchen braun; Bei Nahrungssuche flache Körperhaltung; Größe: bis 52 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen
	<p>Pfeifente (<i>Anas penelope</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Kurzer hellgrauer Schnabel; Männchen haben einen rotbraunen Kopf mit gelber Stirn; Körper grau-weiß-schwarz; Brust graurosa; Männchen sehr ruffreudig; Weibchen und Männchen im Schlichtkleid rostrot; Größe: bis 50 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen
	<p>Spießente (<i>Anas acuta</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Gründelente; Männchen mit braun-weißer Halszeichnung und langem Schwanzspieß; Weibchen braun mit weniger stark ausgeprägtem Spieß; Größe: bis 62 cm > Seltener Gast im Haupt- oder Reservebecken
	<p>Schellente (<i>Bucephala clangula</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tauchente; gedrungener Körper; dreieckiger Kopf; Männchen schwarz-weiß mit weißem Schnabel oberhalb des Schnabels; gelbe Iris; Weibchen unscheinbarer graubraun; Größe: bis 48 cm > vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen
	<p>Zwergsäger (<i>Mergus albellus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Kleiner Säger; Männchen weiß mit feinen schwarzen Linien; Weibchen am Kopf und Nacken rotbraun; Kehle weiß; Rücken grau; Größe: bis 44 cm > im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen und im Reservebecken
	<p>Gänsesäger (<i>Mergus merganser</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Großer Säger; langer, roter Hakenschnabel; Männchen weiß mit grünblau schimmerndem Kopf und Hals; Rücken schwarz; Weibchen am Kopf und Hals rotbraun; Körper hellgrau; markanter Schopf am Hinterkopf; Größe: bis 48 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen
	<p>Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > kleinster Taucher; fast einfarbig braun; zur Brutzeit Kehle und Hals rostrot mit markantem gelben Fleck am Schnabelgrund; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 29 cm > vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen
	<p>Haubentaucher (<i>Podiceps cristatus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Größter Taucher; Unverwechselbare Federhaube am Kopf; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid Kopfseiten und Nacken braun; im Herbst grau-weißes Federkleid; Größe: bis 51 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen
	<p>Schwarzhalstaucher (<i>Podiceps nigricollis</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Kleiner Taucher; gelbe Schmuckfedern hinter der roten Iris; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid schwarz-rotbraun; im Herbst grau-weißes Federkleid; Größe: bis 34 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen
	<p>Rothalstaucher (<i>Podiceps grisegena</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Taucher; gelbe Schnabelbasis; zur Paarungszeit Kopfseiten und Kehle weiß mit rotem Hals und schwarzem Oberkopf; Gefieder graubraun; Größe: bis 46 cm > seltener Gast im Hauptbecken
	<p>Blässhuhn (<i>Fulica atra</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Rallenart; schwarzes Gefieder; Schnabel und Stirn weiß; kräftige Füße; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm > in allen Becken zu sehen
	<p>Teichhuhn (<i>Gallinula chloropus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Rallenart; rote Stirnplatte; roter Schnabel mit gelber Spitze; schwarzbraunes Gefieder; kräftige Füße; Weibchen etwas größer als Männchen; Größe: bis 33 cm > vorrangig am nordwestlichen Ufer des Hauptbeckens
	<p>Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Gefieder überwiegend schwarz; kräftiger Hakenschnabel; grüne Iris; liegt sehr tief im Wasser; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 94 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen
	<p>Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Grau-weiße Färbung mit schwarzen Oberkopfseiten mit zwei langen schwarzen Nackenfedern; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 102 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen
	<p>Silberreiher (<i>Casmerodius albus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Schlanker weißer Reiher mit gelbem Schnabel; Beine grünlich oder schwarz; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 100 cm > im Reservebecken und an den Ufern des Hauptbeckens zu sehen
	<p>Kranich (<i>Grus grus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Großer Schreitvogel; graues Gefieder; Kopf und Hals schwarz-weiß; roter unbefiederter Fleck am Kopf; Jungvögel sandfarben; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 119 cm > seltener Gast im Reservebecken
	<p>Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Oberseite rotbraun mit dunkleren Schwungfedern; abgerundeter langer Schwanz; Beine gelb mit schwarzen Krallen; graublauer Bartstreif; rüttelt häufig mit langen gefächerten Schwanz; Größe: bis zu 37 cm > häufiger Nahrungsgast am Haupt- und Reservebecken
	<p>Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > sehr unterschiedliche Färbungen von überwiegend weiß bis gänzlich dunkelbraun; Schnabel schwarz mit gelber Wachshaut; Füße gelb; im Flug mit brettartig gerader Flügelstellung; Größe: bis 58 cm > häufiger Nahrungsgast im Reservebecken
	<p>Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Männchen mit hellgrau-brauner Flügelzeichnung; Weibchen dunkelbraun mit cremefarbener Kopfhaube; beide im Flug mit V-förmiger Flügelstellung; Größe: bis 55 cm > gelegentlich Nahrungsgast im Reservebecken oder den Röhrichtzonen des Haupt- und Absetzbeckens
	<p>Kornweihe (<i>Circus cyaneus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Männchen silbergrau; Weibchen braun gemustert; beide mit weißem Fleck am Bürzel; beide im Flug mit flach V-förmiger Flügelstellung; Größe: bis 55 cm > seltener Nahrungsgast am Hauptbecken
	<p>Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Kopf weiß mit markantem braunem Augenfleck; Iris gelb; Oberseite dunkelbraun; Unterseite weiß; Federschopf am Hinterkopf; Größe: bis 60 cm > seltener Nahrungsgast am Hauptbeck
	<p>Seeadler (<i>Haliaeetus albicilla</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > großer kräftiger Greifvogel; weißer, kurzer, keilförmiger Schwanz; starke, gelbe Greiffüße; Gefieder braun; brettartige Flügel; Altvogel mit gelbem Schnabel; Weibchen größer als Männchen; Größe: bis 92 cm > seltener Nahrungsgast, meist Jungtiere
	<p>Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > stark gebogener rostroter Schwanz; braunrotes Gefieder; Kopf grauweiß; ruhiger, gleitender Flug; Weibchen und Männchen ähnlich; Größe: bis 72 cm > seltener Nahrungsgast am Hauptbecken
	<p>Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Schwarzer Kopf; Schnabel und Beine rot; weiß-graue Gefiederzeichnung; Männchen und Weibchen gleich; Größe: bis 39 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen
	<p>Silbermöwe (<i>Larus argentatus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > gelber klobiger Schnabel mit rotem Fleck; rosa Beine; Gefieder weiß-silbergrau; Iris gelb; größer als Sturm Möwe; im ersten und zweiten Jahr bräunliches Federkleid; Größe: bis 60 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen
	<p>Sturmmöwe (<i>Larus canus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Schnabel und Beine gelb; Gefieder weiß mit silbergrauen Flügeln; Flügelspitze schwarz; größer als Lachmöwe; kleiner als Silbermöwe; im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 46 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen
	<p>Heringsmöwe (<i>Larus fuscus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > gelber Schnabel mit rotem Fleck; Iris und Beine gelb; Gefieder weiß mit dunkelgrauer Oberseite; Jungvögel im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 56 cm > vorrangig im Hauptbecken zu sehen
	<p>Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Watvogel; schwarz-weißes Gefieder; metallisch grün-violett glänzend; Federschopf am Hinterkopf; Federspitzen beim Männchen größer; Kehle und Brust beim Männchen schwarz; beim Weibchen meist mit weißen Flecken; Größe: bis 31 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen
	<p>Großer Watvogel (<i>Numenius arquata</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Watvogel; sehr großer, gebogener Schnabel; graubraun gemustertes Gefieder; Weibchen größer als Männchen; flötenartige Stimme; Größe: bis 57 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen
	<p>Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Watvogel; langer, gerader Schnabel; kurze Beine; braun gemustertes Gefieder mit hellen Längsstreifen an Kopf und Oberseite; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 28 cm > vorrangig im Reservebecken zu sehen
	<p>Austernfischer (<i>Haematopus ostralegus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Watvogel; langer orangeroter Schnabel; stark abgesetzte schwarzweiße Gefiederfärbung; rote Beine; Männchen und Weibchen sind nicht zu unterscheiden; Größe: bis 44 cm > im Haupt- und Reservebecken zu sehen
	<p>Rohrhammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Kleinvogel des Röhrichts; Männchen mit schwarzem Kopf; Weibchen braun gestreift; Brutet im Röhricht am West- und Südostufer des Hauptbeckens und im Reservebecken; Gesang schilpend; Größe: bis 15,5 cm