Vogelarten am Alfsee

> Beobachtungspunkt Reservebecken im Winter

● Sommervogel
○ Wintervogel
B Brutvogel
> Durchzügler



● ○ > B

Höckerschwan *(Cygnus olor)*

> orangeroter Schnabel mit schwarzem Höcker und schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß; Größe: bis 160 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



○ >

Singschwan *(Cygnus cygnus)*

> gelber Schnabel mit schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß; Hals deutlich gerader als beim Höckerschwan; Größe: bis 160 cm
> vorrangig von November bis Februar vorrangig morgens und abends in der Dämmerung im Reservebecken zu sehen



○ >

Zwergschwan *(Cygnus bewickii)*

> Gefieder weiß; etwas kompakter als Singschwan; an der Schnabelbasis rechteckiges oder rundes gelbes Feld; Gelbanteil geringer als Schwarzanteil; Größe: bis 127 cm
> vorrangig von Nov bis Feb morgens und abends in der Dämmerung im Reservebecken zu sehen



○ >

Blässgans *(Anser albifrons)*

> Blässe über dem kleinen, orangefarbenen Schnabel;



Beine orange; erwachsene Vögel mit schwarzen Streifen am Bauch; kleiner als Graugans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 78 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ > B

Graugans *(Anser anser)*

> Kräftiger, oranger Schnabel; braungraues Gefieder; Beine blaß rosa; größte graue Gans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 84 cm
> In allen Becken zu sehen



○ >

Saatgans *(Anser fabalis)*

> schwarz-orangefarbener Schnabel; Hals und Kopf dunkler gefärbt; Beine orange; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 88 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ >

Kanadagans *(Branta canadensis)*

> Kopf und Hals schwarz mit charakteristischem weißen Kinnband; Auge im schwarzen Stirnfeld; Rücken graubraun; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 100 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



>

Weißwangengans *(Branta leucopsis)*

> Wange und Stirn weiß; Scheitel und Hals schwarz; Auge im weißen Stirnfeld; kleiner schwarzer Schnabel; Oberseite grauschwarze Bänderung; Größe: bis 70 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen

● ○ > B

Nilgans *(Alopochen aegyptiaca)*

> auffällige Gans mit braunem Augenfleck; lange

rosa Beine; Oberseite grau- bis rotbraun; Unterseite grau; Kopf hellgrau; Größe: bis 73 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ > B

Stockente *(Anas platyrhynchos)*

> Schwimmente; graubraunes Gefieder; Männchen mit grünblau schimmerndem Kopf; Beine orange; Federspitzen bei Männchen gekringelt; Weibchen braun; bei beiden auf dem Flügel blaues weiß eingerahmtes Feld; Größe: bis 60 cm

> in allen Becken zu sehen



● ○ > B

Reiherente *(Aythya fuligula)*

> Tauchente; gelbe Iris; Männchen schwarz-weiß mit schwarzem Federschopf am Hinterkopf; Weibchen dunkelbraun z.T. mit weißem Gefiederring um den Schnabel; Größe: bis 47 cm

> In allen Becken zu sehen

● ○ >



Schnatterente *(Anas strepera)*

> orangegelbe Beine; weißes Feld auf dem Flügel; Männchen ist im Prachtkleid dunkelgrau mit schwarzem Körperende sonst braun wie das Weibchen; Größe: bis 56 cm

> im Haupt- und Reservebecken zu sehen

● ○ >



Tafelente *(Aythya ferina)*

> Tauchente; im schwimmen unter Wasser liegender Schwanz; Männchen mit rostrotem Kopf und Hals; hellgrauem Rückengefieder; rote Iris; Weibchen grau bis graubraun; Iris braun; Größe: bis 49 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen

○ >





Krickente *(Anas crecca)*

> Kleine Schwimmente; Männchen haben einen kastanienbraunen Kopf mit grün glänzendem Band am Auge; gelbes Feld an den Hinterflanken; zur Brutzeit ruffreudig; Weibchen braun mit grünem Feld auf dem Flügel; Größe: bis 38 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen

○ >



Pfeifente *(Anas penelope)*

> Kurzer hellgrauer Schnabel; Männchen haben einen rotbraunen Kopf mit gelber Stirn; Körper grau-weiß-schwarz; Brust graurosa; Männchen sehr ruffreudig; Weibchen und Männchen im Schlichtkleid rostrot; Größe: bis 50 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen

>



Spießente *(Anas acuta)*

> Gründelente; Männchen mit braun-weißer Halszeichnung und langem Schwanzspieß; Weibchen braun mit weniger stark ausgeprägtem Spieß; Größe: bis 62 cm

> Seltener Gast im Haupt- oder Reservebecken





○ >

Schellente *(Bucephala clangula)*

> Tauchente; gedrungener Körper; dreieckiger Kopf; Männchen schwarz-weiß mit weißem Fleck oberhalb des Schnabels; gelbe Iris; Weibchen unscheinbarer graubraun; Größe: bis 48 cm

> vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen





○ >

Zwergsäger *(Mergellus albellus)*

> Kleiner Säger; Männchen weiß mit feinen schwarzen Linien; Weibchen am Kopf und Nacken rotbraun; Kehle weiß; Rücken grau; Größe: bis 44 cm

> im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und

Ablauf zu sehen und im Reservebecken



○ >

Gänsesäger *(Mergus merganser)*

> Großer Säger; langer, roter Hakenschnabel; Männchen weiß mit grünblau schimmerndem Kopf und Hals; Rücken schwarz; Weibchen am Kopf und Hals rotbraun; Körper hellgrau; markanter Schopf am Hinterkopf; Größe: 68 cm

> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



○ >

Zwergtaucher *(Tachybaptus ruficollis)*

> kleinster Taucher; fast einfarbig braun; zur Brutzeit Kehle und Hals rostrot mit markantem gelben Fleck am Schnabelgrund; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 29 cm

> vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen



● ○ B

Haubentaucher *(Podiceps cristatus)*

> Größter Taucher; Unverwechselbare Federhaube am Kopf; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid Kopfseiten und Nacken braun; im Herbst grau-weißes Federkleid;

Größe: bis 51 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ > B

Blässhuhn *(Fulica atra)*

> Rallenart; schwarzes Gefieder; Schnabel und Stirn weiß; kräftige Füße; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm
> in allen Becken zu sehen



● ○ > B

Teichhuhn *(Gallinula chloropus)*

> Rallenart; rote Stirnplatte; roter Schnabel mit gelber Spitze; schwarzbraunes Gefieder; kräftige Füße; Weibchen etwas größer als Männchen; Größe: bis 33 cm
> vorrangig am nordwestlichen Ufer des Hauptbeckes



● ○ B

Kormoran *(Phalacrocorax carbo)*

> Gefieder überwiegend schwarz; kräftiger Hakenschnabel; grüne Iris; liegt sehr tief im Wasser; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 94 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○

Graureiher *(Ardea cinerea)*

> Grau-weiße Färbung mit schwarzen Oberkopfseiten mit zwei langen schwarzen Nackenfedern; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 102 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○

Silberreiher *(Casmerodius albus)*

> Schlanker weißer Reiher mit gelbem Schnabel; Beine grünlich oder schwarz; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 100 cm

> im Reservebecken und an den Ufern des Hauptbeckens zu sehen



● ○

Turmfalke *(Falco tinnunculus)*

> Oberseite rotbraun mit dunkleren Schwungfedern; abgerundeter langer Schwanz; Beine gelb mit schwarzen Krallen; graublauer Bartstreif; rüttelt häufig mit langen gefächerten Schwanz; Größe: bis zu 37 cm

> häufiger Nahrungsgast an Haupt- und Reservebecken



● ○ B

Mäusebussard *(Buteo buteo)*

> sehr unterschiedliche Färbungen von überwiegend weiß bis gänzlich dunkelbraun; Schnabel schwarz mit gelber Wachshaut; Füße gelb; im Flug mit brettartig gerader Flügelstellung; Größe: bis 58 cm

> häufiger Nahrungsgast im Reservebecken



>

Kornweihe *(Circus cyaneus)*

> Männchen silbergrau; Weibchen braun gemustert; beide mit weißem Fleck am Bürzel; beide im Flug mit flach V-förmiger Flügelstellung, Größe: bis 55 cm

> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



>

Seeadler *(Haliaeetus albicilla)*

> großer kräftiger Greifvogel; weißer, kurzer, keilförmiger Schwanz; starke, gelbe Greiffüße; Gefieder braun; brettartige Flügel; Altvögel mit gelbem Schnabel; Weibchen größer als Männchen; Größe: bis 92 cm

> seltener Nahrungsgast, meist Jungtiere



● >

Rotmilan *(Milvus milvus)*

> stark gegabelter rostroter Schwanz; braunrotes Gefieder; Kopf grauweiß; ruhiger, gleitender Flug; Weibchen und Männchen ähnlich; Größe: bis 72 cm

> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



● ○ >

Lachmöwe *(Larus ridibundus)*

> Schwarzer Kopf; Schnabel und Beine rot; weiß-graue Gefiederzeichnung; Männchen und Weibchen gleich; Größe: bis 39 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ >

Silbermöwe *(Larus argentatus)*

> gelber klobiger Schnabel mit rotem Fleck; rosa Beine; Gefieder weiß-silbergrau; Iris gelb; größer als Sturmmöwe; im ersten und zweiten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 60 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ >

Sturmmöwe *(Larus canus)*

> Schnabel und Beine gelb; Gefieder weiß mit silbergrauen Flügeln; Flügelspitze schwarz; größer als Lachmöwe; kleiner als Silbermöwe; im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 46 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



○ >

Heringsmöwe *(Larus fuscus)*

> gelber Schnabel mit rotem Fleck; Iris und Beine gelb; Gefieder weiß mit dunkelgrauer Oberseite; Jungvögel im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 56 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



○ > B

Kiebitz *(Vanellus vanellus)*

> Watvogel; schwarz-weißes Gefieder; metallisch grün-violett glänzend; Federschopf am Hinterkopf; Federschopf beim Männchen größer; Kehle und Brust beim Männchen schwarz; beim Weibchen meist mit weißen Flecken; Größe: bis 31 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



○ >

Bekassine *(Gallinago gallinago)*

> Watvogel; langer, gerader Schnabel; kurze Beine; braun gemustertes Gefieder mit hellen Längsstreifen an Kopf und Oberseite; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden, Größe: bis 28 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen