

Vogelarten am Alfsee	
> Beobachtungspunkt Überlaufschwelle im Frühling	
<input checked="" type="radio"/> Sommervogel	<input checked="" type="radio"/> Wintervogel
<input checked="" type="checkbox"/> Brutvogel	<input checked="" type="checkbox"/> Durchzügler
	<p><b>Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; orangeferner Schnabel mit schwarzem Höcker und schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß;</li> <li>Größe: bis 160 cm</li> <li>&gt; im Haupt- und Reservebecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Graugans (<i>Anser anser</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kräftiger, oranger Schnabel; braungraues Gefieder; Beine blaß rosa; größte graue Gans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 84 cm</li> <li>&gt; In allen Becken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kopf und Hals schwarz mit charakteristischem weißen Kinnband; Auge im schwarzen Stirnfeld; Rücken graubraun; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 100 cm</li> <li>&gt; im Haupt- und Reservebecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Brandgans (<i>Tadorna tadorna</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; markante grünschwartz-weiß-braune Gefiederfärbung; roter Schnabel; Männchen mit Höcker am Schnabelansatz; in der Größe zwischen Gans und Ente; Größe: bis 65 cm</li> <li>&gt; im Hauptbecken und im Reservebecken auf den Schlammflächen zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Rostgans (<i>Tadorna ferruginea</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; rotbraunes Gefieder; Kopf creme; Schwingen und Schwanz schwarz; Größe: bis 70 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Reservebecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Nilgans (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; auffällige Gans mit braunem Augenfleck; lange rosa Beine; Oberseite grau- bis rotbraun; Unterseite grau; Kopf hellgrau; Größe: bis 73 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Reservebecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Schwimmende; graubraunes Gefieder; Männchen mit grünblau schimmerndem Kopf; Beine orange; Federspitzen bei Männchen gekringelt; Weibchen braun; bei beiden auf dem Flügel blaues weiß eingerahmtes Feld; Größe: bis 60 cm</li> <li>&gt; in allen Becken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tauchente; gelbe Iris; Männchen schwarz-weiß mit schwarzem Federschopf am Hinterkopf; Weibchen dunkelbraun z.T. mit weißem Gefiederring und den Schnabel; Größe: bis 47 cm</li> <li>&gt; In allen Becken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Schnatterente (<i>Anas strepera</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; orangegelbe Beine; weißes Feld auf dem Flügel; Männchen ist im Prachtkleid dunkelgrau mit schwarzem Körperende sonst braun wie das Weibchen; Größe: bis 56 cm</li> <li>&gt; im Haupt- und Reservebecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Tafelente (<i>Aythya ferina</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tauchente; im Schwimmen unter Wasser liegender Schwanz; Männchen mit rostrotem Kopf und Hals; hellgrauem Rückengefieder; rote Iris; Weibchen grau bis graubraun; Iris braun; Größe: bis 49 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Hauptbecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Krickente (<i>Anas crecca</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kleine Schwimmende; Männchen haben einen kastanienbraunen Kopf mit grün glänzendem Band am Auge; gelbes Feld an den Hinterflanken; zur Brutzeit ruffreudig; Weibchen braun mit grünem Feld auf dem Flügel; Größe: bis 38 cm</li> <li>&gt; im Haupt- und Reservebecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Löffelente (<i>Anas clypeata</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Gründelente; kennzeichnend ist der breite löffel-ähnliche Schnabel; Männchen mit buntem weiß-schwarz-braunem Gefieder; gelbe Iris; Weibchen braun; Bei Nahrungssuche flache Körperhaltung; Größe: bis 52 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Hauptbecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Pfeifente (<i>Anas penelope</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kurzer hellgrauer Schnabel; Männchen haben einen rotbraunen Kopf mit gelber Stirn; Körper grau-weiß-schwarz; Brust graubraun; Männchen sehr ruffreudig; Weibchen und Männchen im Schlichtkleid rostrot; Größe: bis 50 cm</li> <li>&gt; im Haupt- und Reservebecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; kleinster Taucher; fast einfarbig braun; zur Brutzeit Kehle und Hals rostrot mit markantem gelben Fleck am Schnabelgrund; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 29 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Hauptbecken und an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Haubentaucher (<i>Podiceps cristatus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Größter Taucher; Unverwechselbare Federhaube am Kopf; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid Kopfseiten und Nacken braun; im Herbst grau-weißes Federkleid</li> <li>Größe: bis 51 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Hauptbecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Schwarzhalstaucher (<i>Podiceps nigricollis</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kleiner Taucher; gelbe Schmuckfedern hinter der roten Iris; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid schwarz-rotbraun; im Herbst grau-weißes Federkleid; Größe: bis 34 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Hauptbecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Rothalstaucher (<i>Podiceps grisegena</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Taucher; gelbe Schnabelbasis; zur Paarungszeit Kopfseiten und Kehle weiß mit rotem Hals und schwarzem Oberkopf; Gefieder graubraun; Größe: bis 46 cm</li> <li>&gt; seltener Gast im Hauptbecken</li> </ul>
	<p><b>Blässhuhn (<i>Fulica atra</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rallenart; schwarzes Gefieder; Schnabel und Stirn weiß; kräftige Füße; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm</li> <li>&gt; in allen Becken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Teichhuhn (<i>Gallinula chloropus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rallenart; rote Stirnplatte; roter Schnabel mit gelber Spitze; schwarzbrauner Schnabel mit dunkler Spitze; Weibchen etwas größer als Männchen; Größe: bis 33 cm</li> <li>&gt; vorrangig am nordwestlichen Ufer des Hauptbeckes</li> </ul>
	<p><b>Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Gefieder überwiegend schwarz; kräftiger Hakenschnabel; grüne Iris; liegt sehr tief im Wasser; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 94 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Reservebecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Grau-weiße Färbung mit schwarzen Nackenseiten mit zwei langen schwarzen Nackenfedern; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 102 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Reservebecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Silberreiher (<i>Casmerodius albus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Schlanker weißer Reiher mit gelbem Schnabel; Beine grünlich oder schwarz; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 100 cm</li> <li>&gt; im Reservebecken und an den Ufern des Hauptbeckens zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oberseite rotbraun mit dunkleren Schwungfedern; abgerundeter schwarzer Schwanz; Beine gelb mit schwarzen Krallen; graublauer Bartstreif; rüttelt häufig mit langen gefächerten Schwanz; Größe: bis zu 37 cm</li> <li>&gt; häufiger Nahrungsgast an Haupt- und Reservebecken</li> </ul>
	<p><b>Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; sehr unterschiedliche Färbungen von überwiegend weiß bis gänzlich dunkelbraun; Schnabel schwarz mit gelber Wachshaut; Füße gelb; im Flug mit breittartig gerader Flügelstellung; Größe: bis 58 cm</li> <li>&gt; häufiger Nahrungsgast im Reservebecken</li> </ul>
	<p><b>Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Männchen hellgrau-brauner Flügelzeichnung; Weibchen dunkelbraun mit cremefarbener Kopfhaut; beide im Flug mit V-förmiger Flügelstellung; Größe: bis 55 cm</li> <li>&gt; gelegentlicher Nahrungsgast im Reservebecken und den Röhrichtzonen des Haupt- und Absetzbeckens</li> </ul>
	<p><b>Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kopf weiß mit markantem braunem Augenfleck; Iris gelb; Oberseite dunkelbraun; Unterseite weiß; Federschopf am Hinterkopf; Größe: bis 60 cm</li> <li>&gt; seltener Nahrungsgast am Hauptbecken</li> </ul>
	<p><b>Seeadler (<i>Haliaeetus albicilla</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; großer kräftiger Greifvogel; weißer, keilförmiger Schwanz; starke, gelbe Kräfte; Gefieder braun; breittartige Flügel; Altvögel mit gelbem Schnabel; Weibchen größer als Männchen; Größe: bis 92 cm</li> <li>&gt; seltener Nahrungsgast, meist Jungtiere</li> </ul>
	<p><b>Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; stark gebogelter rostroter Schwanz; braunrotes Gefieder; Kopf grauweiß; ruhiger, gleitender Flug; Weibchen und Männchen ähnlich; Größe: bis 72 cm</li> <li>&gt; seltener Nahrungsgast am Hauptbecken</li> </ul>
	<p><b>Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; vorwiegend dunkelbraun gefärbt; Brust und Bauch häufig etwas heller; Kopf und Hals im Adultkleid hellgrau; Schwanz leicht gebogelt; Größe: bis 58 cm</li> <li>&gt; seltener Nahrungsgast am Hauptbecken</li> </ul>
	<p><b>Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Schwarzer Kopf; Schnabel und Beine rot; weiß-graue Gefiederzeichnung; Männchen und Weibchen gleich; Größe: bis 39 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Hauptbecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Silbermöwe (<i>Larus argentatus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; gelber klobiger Schnabel mit rotem Fleck; rosa Beine; Gefieder weiß-silbergrau; Iris gelb; bis Sturmsee; im ersten und zweiten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 60 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Hauptbecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Sturmmöwe (<i>Larus canus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Schnabel und Beine gelb; Gefieder weiß mit silbergrauen Flügeln; Flügelspitze schwarz; größer als Lachmöwe; kleiner als Silbermöwe; im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 46 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Hauptbecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Heringsmöwe (<i>Larus fuscus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; gelber Schnabel mit rotem Fleck; Iris und Beine gelb; Gefieder weiß mit dunkelgrauer Oberseite; Jungvögel im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 56 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Hauptbecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Zwergmöwe (<i>Hydrocoloeus minutus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kleinste Möwe; schwarzer Kopf und Schnabel; Beine rot; Gefieder grau-weiß; im Schlichtkleid schwarzer Ohrfleck; Größe: bis 28 cm</li> <li>&gt; vorrangig in der 2. Aprilhälfte im Hauptbecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Trauerseeschwalbe (<i>Chlidomias niger</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; schwarz-graues Gefieder; Schnabel und Beine dunkel; lange, schlanke Flügel; wellenförmig, schwebendes Flugbild; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Hauptbecken zu sehen während des Heimzuges im Frühjahr</li> </ul>
	<p><b>Flussseeschwalbe (<i>Sterna hirundo</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oberseite grau mit schwarzer Haube; Unterseite hellgrau; roter Schnabel mit schwarzer Schnabelspitze; Beine rot; Schwanz tief gebogelt; Größe: bis zu 37 cm</li> <li>&gt; Seltener Gast am Hauptbecken</li> </ul>
	<p><b>Sandregenpfeifer (<i>Charadrius hiaticula</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; amselgroßer Watvogel; Rücken graubraun; Unterseite weiß; im Prachtkleid Schnabel orange mit schwarzer Spitze, Beine orange, schwarz geschlossenes Brustband, schwarzes Stirnband; Größe: 20 cm</li> <li>&gt; seltener Gast im Hochsommer an den Durchlässen der Überlaufschwelle</li> </ul>
	<p><b>Flussuferläufer (<i>Actitis hypoleucos</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Watvogel; braunes Rückengefieder und weiße Unterseite; weißer Keil zwischen Flügel und Brust; streift oft mit dem Körperende; im Flug mit weißem Streifen im Flügel; Größe: 20 cm</li> <li>&gt; vorrangig im Hauptbecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Alpenstrandläufer (<i>Calidris alpina</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Watvogel; Schnabel dunkel und am Ende leicht nach unten gebogen; Beine olivgrün bis schwarz; Augen dunkel; Bauch und Brust weiß; Oberseite graubraun; im Prachtkleid typischer schwarzer Brustfleck und Federn auf Oberseite variabel rotbraun; Größe: 21 cm</li> <li>&gt; selten im Hochsommer an der Überlaufschwelle</li> </ul>
	<p><b>Grünschenkel (<i>Tringa nebularia</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Watvogel; grüngraue lange Beine; langer, leicht nach oben gebogener Schnabel in grüngrün bis schwarz; Augen dunkel; Bauch und Brust weiß; Oberseite graubraun; im Prachtkleid typischer schwarzer Brustfleck und Federn auf Oberseite variabel rotbraun; Größe: 21 cm</li> <li>&gt; selten im Hochsommer an der Überlaufschwelle</li> </ul>
	<p><b>Austernfischer (<i>Haematopus ostralegus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Watvogel; langer orangeroter Schnabel; stark abgesetzte schwarzweiße Gefiederfärbung; rote Beine; Männchen und Weibchen sind nicht zu unterscheiden; Größe: bis 44 cm</li> <li>&gt; im Haupt- und Reservebecken zu sehen</li> </ul>
	<p><b>Rohrhammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kleinvogel des Röhrichts; Männchen mit schwarzem Kopf; Weibchen braun gestreift; Brütet im Röhricht am West- und Südostufer des Hauptbeckens und im Reservebecken; Gesang schilpend; Größe: bis 15,5 cm</li> </ul>
	<p><b>Sumpffrohsänger (<i>Acrocephalus palustris</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kleinvogel der feuchten, üppigen Hochstaudenflur; Oberseite einfarbig, graubraun; Unterseite gelblich-weiß; Kehle weißlicher; Federn am Hinterkopf häufig aufgestellt; imitiert Rufe anderer Vögel und mischt sie mit eigenen Strophen; Größe: bis 15 cm</li> <li>&gt; Im Reservebecken zu hören</li> </ul>
	<p><b>Teichrohrsänger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Röhrichtsvogel; Oberseite einfarbiges, graubraunes Gefieder; Unterseite beigeweiß; spitzer Kopf mit flachem Scheitel; leise-schwatzender Gesang; Gesangsbauteil mit vielen tire tire trecke trecke Lauten; Größe: bis 14 cm</li> </ul>
	<p><b>Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; braunrote Kehle und Stirn sowie tief gebogelter Schwanz; Oberseite und Brustband blauschwarz; Unterseite rahmweiß; Größe: 21 cm</li> <li>&gt; hauptsächlich im Frühjahrszug, sitzen dann oft im Schilf oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken</li> </ul>
	<p><b>Mehlschwalbe (<i>Delichon urbicum</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; schwach gebogelter Schwanz und weißer Bürzel; Kopf, Rücken, Flügeloberseiten und Schwanz blauschwarz; Unterseite mehlfarbig; Größe: 15 cm</li> <li>&gt; hauptsächlich im Frühjahrszug, sitzen dann oft im Schilf oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken</li> </ul>
	<p><b>Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kleine europäische Schwalbenart; Oberseite matt graubraun; Unterseite weiß mit graubraunem Brustband; Schwanz leicht gebogelt; Größe: bis 13 cm</li> <li>&gt; hauptsächlich im Frühjahrszug, sitzen dann oft im Schilf oder in den Bäumen auf dem Damm am Hauptbecken</li> </ul>
	<p><b>Mauersegler (<i>Apus apus</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Großer Segler; lange sichelförmige Flügel; kurzer gebogelter Schwanz; Gefieder schwarzbraun; weißer Kehlfleck; kurzer schwarzer Schnabel; Größe: bis zu 19 cm</li> <li>&gt; Nahrungsgast zu Mückenhochzeiten. Fliegt oft dicht an Spaziergängern vorbei</li> </ul>