Vogelarten am Alfsee

> Beobachtungspunkt Überlaufschwelle im Herbst

● Sommervogel
○ Wintervogel
B Brutvogel
> Durchzügler



● ○ > B

Höckerschwan *(Cygnus olor)*

> orangeroter Schnabel mit schwarzem Höcker und schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß; Größe: bis 160 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



○ >

Blässgans *(Anser albifrons)*

> Blässe über dem kleinen, orangefarbenen Schnabel; Beine orange; erwachsene Vögel mit schwarzen Streifen am Bauch; kleiner als Graugans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 78 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ > B

Graugans *(Anser anser)*

> Kräftiger, oranger Schnabel; braungraues Gefieder; Beine blaß rosa; größte graue Gans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 84 cm
> In allen Becken zu sehen



○ >

Saatgans *(Anser fabalis)*

> schwarz-orangefarbener Schnabel; Hals und Kopf dunkler gefärbt; Beine orange; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 88 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ >

Kanadagans *(Branta canadensis)*

> Kopf und Hals schwarz mit charakteristischem weißen Kinnband; Auge im schwarzen Stirnfeld; Rücken graubraun; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 100 cm

> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



>

Brandgans *(Tadorna tadorna)*

> markante grünschwarz-weiß-braune Gefiederfärbung; roter Schnabel; Männchen mit Höcker am Schnabelansatz; in der Größe zwischen Gans und Ente; Größe: bis 65 cm

> im Hauptbecken und im Reservebecken auf den Schlammflächen zu sehen



>

Rostgans *(Tadorna ferruginea)*

> rotbraunes Gefieder; Kopf creme; Schwingen und Schwanz schwarz; Größe: bis 70 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ > B

Nilgans *(Alopochen aegyptiaca)*

> auffällige Gans mit braunem Augenfleck; lange rosa Beine; Oberseite grau- bis rotbraun; Unterseite grau; Kopf hellgrau; Größe: bis 73 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○ > B

Stockente *(Anas platyrhynchos)*

> Schwimmente; graubraunes Gefieder; Männchen mit grünblau schimmerndem Kopf; Beine orange; Federspitzen bei Männchen gekringelt; Weibchen braun; bei beiden auf dem Flügel blaues weiß

eingerahmtes Feld; Größe: bis 60 cm
> in allen Becken zu sehen





● ○ > B

Reiherente *(Aythya fuligula)*

> Tauchente; gelbe Iris; Männchen schwarz-weiß mit schwarzem Federschopf am Hinterkopf; Weibchen dunkelbraun z.T. mit weißem Gefiederring um den Schnabel; Größe: bis 47 cm
> In allen Becken zu sehen



● ○ >

Schnatterente *(Anas strepera)*

> orangegelbe Beine; weißes Feld auf dem Flügel; Männchen ist im Prachtkleid dunkelgrau mit schwarzem Körperende sonst braun wie das Weibchen; Größe: bis 56 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



● ○ >

Tafelente *(Aythya ferina)*

> Tauchente; im schwimmen unter Wasser liegender Schwanz; Männchen mit rostrotem Kopf und Hals; hellgrauem Rückengefieder; rote Iris; Weibchen grau bis graubraun; Iris braun; Größe: bis 49 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



○ >

Krickente *(Anas crecca)*

> Kleine Schwimmente; Männchen haben einen kastanienbraunen Kopf mit grün glänzendem Band am Auge; gelbes Feld an den Hinterflanken; zur Brutzeit ruffreudig; Weibchen braun mit grünem Feld auf dem Flügel; Größe: bis 38 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen





Knäkente *(Anas querquedula)*

> Kleine Schwimmente; Männchen mit breitem weißen Überaugenstreif am braunen Kopf; grauweißes Rückengefieder; Weibchen braun mit dunkelbrauner Kappe am Kopf; Größe: bis 41 cm
> vorrangig im Reserve- und Absetzbecken zu sehen





Löffelente *(Anas clypeata)*

> Gründelente; kennzeichnend ist der breite löffelähnliche Schnabel; Männchen mit buntem weiß-schwarz-braunem Gefieder; gelbe Iris; Weibchen braun; Bei Nahrungssuche flache Körperhaltung; Größe: bis 52 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen





Pfeifente *(Anas penelope)*

> Kurzer hellgrauer Schnabel; Männchen haben einen rotbraunen Kopf mit gelber Stirn; Körper grau-weiß-schwarz; Brust graurosa; Männchen sehr ruffreudig; Weibchen und Männchen im Schlichtkleid rostrot; Größe: bis 50 cm

> im Haupt- und Reservebecken zu sehen





>

Spießente *(Anas acuta)*

> Gründelente; Männchen mit braun-weißer Halszeichnung und langem Schwanzspieß; Weibchen braun mit weniger stark ausgeprägtem Spieß; Größe: bis 62 cm

> Seltener Gast im Haupt- oder Reservebecken



○ >

Schellente *(Bucephala clangula)*

> Tauchente; gedrungener Körper; dreieckiger Kopf; Männchen schwarz-weiß mit weißem Fleck oberhalb des Schnabels; gelbe Iris; Weibchen unscheinbarer graubraun; Größe: bis 48 cm

> vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen





Zwergsäger *(Mergellus albellus)*

> Kleiner Säger; Männchen weiß mit feinen schwarzen Linien; Weibchen am Kopf und Nacken rotbraun; Kehle weiß; Rücken grau; Größe: bis 44 cm
> im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen und im Reservebecken



Gänsesäger *(Mergus merganser)*

> Großer Säger; langer, roter Hakenschnabel; Männchen weiß mit grünblau schimmerndem Kopf und Hals; Rücken schwarz; Weibchen am Kopf und Hals rotbraun; Körper hellgrau; markanter Schopf am Hinterkopf; Größe: 68 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



○ >

Zwergtaucher *(Tachybaptus ruficollis)*

> kleinster Taucher; fast einfarbig braun; zur Brutzeit Kehle und Hals rostrot mit markantem gelben Fleck am Schnabelgrund; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 29 cm

> vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen



● ○ B

Haubentaucher *(Podiceps cristatus)*

> Größter Taucher; Unverwechselbare Federhaube am Kopf; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid Kopfseiten und Nacken braun; im Herbst grau-weißes Federkleid Größe: bis 51 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



○ > B

Schwarzhalstaucher *(Podiceps nigricollis)*

> Kleiner Taucher; gelbe Schmuckfedern hinter der roten Iris; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid schwarz-rotbraun; im Herbst grau-weißes Federkleid; Größe: bis 34 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



>

Rothalstaucher *(Podiceps grisegena)*

> Taucher; gelbe Schnabelbasis; zur Paarungszeit Kopfseiten und Kehle weiß mit rotem Hals und schwarzem Oberkopf; Gefieder graubraun; Größe: bis 46 cm

> seltener Gast im Hauptbecken



● ○ > B

Blässhuhn *(Fulica atra)*

> Rallenart; schwarzes Gefieder; Schnabel und Stirn weiß; kräftige Füße; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm

> in allen Becken zu sehen



● ○ > B

Teichhuhn *(Gallinula chloropus)*

> Rallenart; rote Stirnplatte; roter Schnabel mit gelber Spitze; schwarzbraunes Gefieder; kräftige Füße; Weibchen etwas größer als Männchen; Größe: bis 33 cm

> vorrangig am nordwestlichen Ufer des Hauptbeckes



● ○ B

Kormoran *(Phalacrocorax carbo)*

> Gefieder überwiegend schwarz; kräftiger Hakenschnabel; grüne Iris; liegt sehr tief im Wasser; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 94 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○

Graureiher *(Ardea cinerea)*

> Grau-weiße Färbung mit schwarzen Oberkopfseiten mit zwei langen schwarzen Nackenfedern; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 102 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



● ○

Silberreiher *(Casmerodius albus)*

> Schlanker weißer Reiher mit gelbem Schnabel; Beine grünlich oder schwarz; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 100 cm

> im Reservebecken und an den Ufern des Hauptbeckens zu sehen

● ○

Turmfalke *(Falco tinnunculus)*



> Oberseite rotbraun mit dunkleren Schwungfedern; abgerundeter langer Schwanz; Beine gelb mit schwarzen Krallen; graublauer Bartstreif; rüttelt häufig mit langen gefächerten Schwanz; Größe: bis zu 37 cm
> häufiger Nahrungsgast an Haupt- und Reservebecken



● ○ B

Mäusebussard *(Buteo buteo)*

> sehr unterschiedliche Färbungen von überwiegend weiß bis gänzlich dunkelbraun; Schnabel schwarz mit gelber Wachshaut; Füße gelb; im Flug mit brettartig gerader Flügelstellung; Größe: bis 58 cm
> häufiger Nahrungsgast im Reservebecken



● >

Fischadler *(Pandion haliaetus)*

> Kopf weiß mit markantem braunem Augenstreif; Iris gelb; Oberseite dunkelbraun; Unterseite weiß; Federschopf am Hinterkopf; Größe: bis 60 cm
> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



>

Seeadler *(Haliaeetus albicilla)*

> großer kräftiger Greifvogel; weißer, kurzer, keilförmiger Schwanz; starke, gelbe Greiffüße; Gefieder braun; brettartige Flügel; Altvögel mit gelbem Schnabel; Weibchen größer als Männchen; Größe: bis 92 cm
> seltener Nahrungsgast, meist Jungtiere



● >

Rotmilan *(Milvus milvus)*

> stark gegabelter rostroter Schwanz; braunrotes Gefieder; Kopf grauweiß; ruhiger, gleitender Flug; Weibchen und Männchen ähnlich; Größe: bis 72 cm
> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken



● ○ >

Lachmöwe *(Larus ridibundus)*

> Schwarzer Kopf; Schnabel und Beine rot; weiß-graue Gefiederzeichnung; Männchen und Weibchen gleich; Größe: bis 39 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ >

Silbermöwe *(Larus argentatus)*

> gelber klobiger Schnabel mit rotem Fleck; rosa Beine; Gefieder weiß-silbergrau; Iris gelb; größer als Sturmmöwe; im ersten und zweiten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 60 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



● ○ >

Sturmmöwe *(Larus canus)*

> Schnabel und Beine gelb; Gefieder weiß mit silbergrauen Flügeln; Flügelspitze schwarz; größer als Lachmöwe; kleiner als Silbermöwe; im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 46 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



○ >

Heringsmöwe *(Larus fuscus)*

> gelber Schnabel mit rotem Fleck; Iris und Beine gelb; Gefieder weiß mit dunkelgrauer Oberseite; Jungvögel im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 56 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



>

Sandregenpfeifer *(Charadrius hiaticula)*

> amselgroßer Watvogel; Rücken graubraun; Unterseite weiß; im Prachtkleid: Schnabel orange mit schwarzer Spitze, Beine orange, schwarz geschlossenes Brustband, schwarzes Stirnband; Größe: 20 cm

> seltener Gast im Hochsommer an den Durchlässen

der Überlaufschwelle



● >

Flussuferläufer *(Actitis hypoleucos)*

> Watvogel; braunes Rückengefieder und weiße Unterseite; weißer Keil zwischen Flügel und Brust; wippt oft mit dem Körperende; im Flug mit weißem Streifen im Flügel; Größe: 20 cm

> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



>

Alpenstrandläufer *(Calidris alpina)*

> Watvogel; Schnabel dunkel und am Ende leicht nach unten gebogen; Beine olivgrün bis schwarz; Augen dunkel; Bauch und Brust weiß; Oberseite graubraun; im Prachtkleid typischer schwarzer Brustfleck und Federn auf Oberseite variabel rostbraun; Größe: 21 cm

> selten im Hochsommer an der Überlaufschwelle



>

Grünschenkel *(Tringa nebularia)*

> Watvogel; grüngraue lange Beine; langer, leicht nach oben gebogener Schnabel in grüngrau mit dunkler Spitze; braun-grau-weiß gemustertes Gefieder; Flügeloberseite einfarbig ohne Zeichnung; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 34 cm

> vorrangig im Reservebecken zu sehen



>

Austernfischer *(Haematopus ostralegus)*

> Watvogel; langer orangeroter Schnabel; stark abgesetzte schwarzweiße Gefiederfärbung; rote Beine; Männchen und Weibchen sind nicht zu unterscheiden; Größe: bis 44 cm

> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



B

Rohrammer *(Emberiza schoeniclus)*

> Kleinvogel des Röhrichts; Männchen mit schwarzem Kopf; Weibchen braun gestreift; Brütet im Röhricht am West- und Südostufer des Hauptbeckens und im Reservebecken; Gesang schilpend;
Größe: bis 15,5 cm