

Vogelarten am Alfsee

> Beobachtungspunkt Überlaufschwelle im Winter

Sommervogel

Brutvogel

Wintervogel

Durchzügler



Höckerschwan (*Cygnus olor*)

> orangeroter Schnabel mit schwarzem Höcker und schwarzer Schnabelspitze; Gefieder weiß; Größe: bis 160 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



Blässgans (*Anser albifrons*)

> Blässe über dem kleinen, orangefarbenen Schnabel; Beine orange; erwachsene Vögel mit schwarzen Streifen am Bauch; kleiner als Graugans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 78 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Graugans (*Anser anser*)

> Kräftiger, oranger Schnabel; braungraues Gefieder; Beine blaß rosa; größte graue Gans; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 84 cm
> In allen Becken zu sehen



Saatgans (*Anser fabalis*)

> schwarz-orangefarbener Schnabel; Hals und Kopf dunkler gefärbt; Beine orange; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 88 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Kanadagans (*Branta canadensis*)

> Kopf und Hals schwarz mit charakteristischem weißen Kinnband; Auge im schwarzen Stirnfeld; Rücken graubraun; Männchen und Weibchen gleich gefärbt; Größe: bis 100 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)

> auffällige Gans mit braunem Augenfleck; lange rosa Beine; Oberseite grau- bis rotbraun; Unterseite grau; Kopf hellgrau; Größe: bis 73 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Stockente (*Anas platyrhynchos*)

> Schwimmente; graubraunes Gefieder; Männchen mit grünblau schimmerndem Kopf; Beine orange; Federspitzen bei Männchen gekringelt; Weibchen braun; bei beiden auf dem Flügel blaues weiß eingerahmtes Feld; Größe: bis 60 cm
> in allen Becken zu sehen



Reiherente (*Aythya fuligula*)

> Tauchente; gelbe Iris; Männchen schwarz-weiß mit schwarzem Federschopf am Hinterkopf; Weibchen dunkelbraun z.T. mit weißem Gefiederring um den Schnabel; Größe: bis 47 cm
> In allen Becken zu sehen



Schnatterente (*Anas strepera*)

> orangegelbe Beine; weißes Feld auf dem Flügel; Männchen ist im Prachtkleid dunkelgrau mit schwarzem Körperende sonst braun wie das Weibchen; Größe: bis 56 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



Tafelente (*Aythya ferina*)

> Tauchente; im Schwimmen unter Wasser liegender graubraun; Männchen mit rotem Kopf; Weibchen hellgrau; Rückengefieder; rostre Iris; Weibchen grau bis graubraun; Iris braun; Größe: bis 49 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



Krickente (*Anas crecca*)

> Kleine Schwimmente; Männchen haben einen kastanienbraunen Kopf mit grün glänzendem Band am Auge; gelbes Feld an den Hinterflanken; zur Brutzeit ruffreudig; Weibchen braun mit grünem Feld auf dem Flügel; Größe: bis 38 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



Löffelente (*Anas clypeata*)

> Gründelente; kennzeichnend ist der breite löffelförmige Schnabel; Männchen mit buntem weiß-schwarz-braunem Gefieder; gelbe Iris; Weibchen braun; Bei Nahrungssuche flache Körperhaltung; Größe: bis 52 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



Pfeifente (*Anas penelope*)

> Kurzer hellgrauer Schnabel; Männchen haben einen rotbraunen Kopf mit gelber Stirn; Körper grau-weiß-schwarz; Brust graurosa; Männchen sehr ruffreudig; Weibchen und Männchen im Schlichtkleid rostrot; Größe: bis 50 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



Spießente (*Anas acuta*)

> Gründelente; Männchen mit braun-weißer Halszeichnung und langem schwarzschnäbel; Weibchen braun mit wenigem stark ausgeprägtem Spieß; Größe: bis 62 cm
> Seltener Gast im Haupt- oder Reservebecken



Schellente (*Bucephala clangula*)

> Tauchente; gedrungener Körper; dreieckiger Kopf; Männchen schwarz-weiß mit weißem Fleck oberhalb des Schnabels; gelbe Iris; Weibchen graubraun; Größe: bis 48 cm
> vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen



Zwergsäger (*Mergellus albellus*)

> Kleiner Säger; Männchen weiß mit feinen schwarzen Linien; Weibchen weiß mit Nacken rotbraun; Kehle weiß; Rücken grau; Größe: bis 44 cm
> im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen und im Reservebecken



Gänsesäger (*Mergus merganser*)

> Großer Säger; langer, roter Hakenschnabel; Männchen weiß mit grünblau schimmerndem Kopf und Hals; Rücken schwarz; Weibchen am Kopf und Hals rotbraun; Körper hellgrau; markanter Schopf am Hinterkopf; Größe: 68 cm
> im Haupt- und Reservebecken zu sehen



Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

> kleinster Taucher; fast einfarbig braun; zur Brutzeit Kehle und Hals rostrot mit markantem gelben Fleck am Schnabelgrund; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 29 cm
> vorrangig im Hauptbecken an der Überlaufschwelle und Ablauf zu sehen



Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

> Größter Taucher; Unverwechselbare Federhaube am Kopf; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid Kopfseiten und Nacken braun; im Herbst grau-weißes Federkleid Größe: bis 51 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

> Kleiner Taucher; gelbe Schmuckfedern hinter der roten Iris; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; im Prachtkleid schwarz-rotbraun; im Herbst grau-weißes Federkleid; Größe: bis 34 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen



Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

> Taucher; gelbe Schnabelbasis; zur Paarungszeit Kopfseiten und Kehle weiß mit rotem Hals und schwarzem Hinterkopf; Gefieder graubraun; Größe: bis 46 cm
> seltener Gast im Hauptbecken



Blässhuhn (*Fulica atra*)

> Rallenart; schwarzes Gefieder; Schnabel und Stirn weiß; kräftige Füße; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 26 cm
> in allen Becken zu sehen



Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

> Rallenart; rote Stirnplatte; roter Schnabel mit gelber Spitze; schwarzbraunes Gefieder; kräftige Füße; Weibchen größer als Männchen; Größe: bis 33 cm
> vorrangig am nordwestlichen Ufer des Hauptbeckes



Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

> Gefieder überwiegend schwarz; kräftiger Hakenschnabel; grüne Iris; liegt sehr tief im Wasser; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 94 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Graureiher (*Ardea cinerea*)

> Grau-weiße Färbung mit schwarzen Oberkopfseiten mit zwei langen schwarzen Nackenfedern; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 102 cm
> vorrangig im Reservebecken zu sehen



Silberreiher (*Casmerodius albus*)

> Schlanker weißer Reiher mit gelbem Schnabel; Beine grünlich oder schwarz; Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden; Größe: bis 100 cm
> im Reservebecken und an den Ufern des Hauptbeckens zu sehen



Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

> Oberseite rotbraun mit dunkleren Schwungfedern; abgerundeter langer Schnabel; Beine gelb mit schwarzen Krallen; graublauer Bartstreif; rüttelt häufig mit langen gefächerten Schwanz; Größe: bis zu 37 cm
> häufiger Nahrungsgast an Haupt- und Reservebecken

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

> sehr unterschiedliche Färbungen von überwiegend weiß bis gänzlich dunkelbraun; Schnabel schwarz mit gelber Wachsheit; Füße gelb; im Flug mit breittartig gerader Flügelstellung; Größe: bis 58 cm
> häufiger Nahrungsgast im Reservebecken

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

> großer kräftiger Greifvogel; weißer, kurzer, keilförmiger Schwanz; starke, gelbe Greiffüße; Gefieder braun; breittartige Flügel; Altvögel mit gelbem Schnabel; Weibchen größer als Männchen; Größe: bis 92 cm
> seltener Nahrungsgast, meist Jungtiere

Rotmilan (*Milvus milvus*)

> stark gebogelter rostroter Schwanz; braunrotes Gefieder; Kopf grauweiß; ruhiger, gleitender Flug; Weibchen und Männchen ähnlich; Größe: bis 72 cm
> seltener Nahrungsgast am Hauptbecken

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

> Schwarzer Kopf; Schnabel und Beine rot; weiß-graue Gefiederzeichnung; Männchen und Weibchen gleich; Größe: bis 39 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen

Silbermöwe (*Larus argentatus*)

> gelber klobiger Schnabel mit rotem Fleck; rosa Beine; Gefieder weiß-silbergrau; Iris gelb; größer als Sturmmöwe; im ersten und zweiten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 60 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen

Sturmmöwe (*Larus canus*)

> Schnabel und Beine gelb; Gefieder weiß mit silbergrauen Flügeln; Flügelspitze schwarz; größer als Lachmöwe; kleiner als Silbermöwe; im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 46 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

> gelber Schnabel mit rotem Fleck; Iris und Beine gelb; Gefieder weiß mit dunkelgrauer Oberseite; Jungvögel im ersten Jahr bräunliches Gefieder; Größe: bis 56 cm
> vorrangig im Hauptbecken zu sehen

Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*)

> Kleinvogel des Röhrrichts; Männchen mit schwarzem Kopf; Weibchen braun gestreift; Brutet im Röhrrecht am West- und Südofer des Hauptbeckens und im Reservebecken; Gesang schilpend; Größe: bis 15,5 cm